

Rapport annuel act-*info* 2010

Prise en charge et traitement des dépendances en Suisse
Résultats du système de monitoring



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

Prise en charge et traitement des dépendances en Suisse

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Importance des systèmes de monitoring dans le domaine de l'aide aux personnes dépendantes	3
1.2	Le système de monitoring act-info	4
1.2.1	Objectif d'act-info	4
1.2.2	Les instruments act-info	5
1.2.3	Exploitations de routine et diffusion des résultats	7
1.3	Statistiques sectorielles participantes: situation 2010	8
1.4	Autres domaines de l'aide aux personnes dépendantes	9
1.5	Saisie des données	10
1.6	Protection des données	12
2	Client·es et client·es des secteurs ambulatoire et résidentiel en 2010	13
2.1	Aspects méthodologiques	13
2.1.1	Degré de couverture	13
2.1.2	Données manquantes	15
2.1.3	Unité d'analyse et données utilisées	15
2.1.4	Sous-groupes (variables indépendantes)	17
2.1.5	Variables cibles (variables dépendantes)	18
2.1.6	Procédures d'analyse	18
2.2	Résultats	18
2.2.1	Données disponibles: admissions enregistrées et problème principal	18
2.2.2	Répartition hommes/femmes selon le problème principal au moment de l'admission	20
2.2.3	Âge moyen des client·e-s au moment de l'admission	20
2.2.4	Initiative du premier traitement	21
2.2.5	Âge moyen au moment de la première consommation	21
2.2.6	Consommation quotidienne avant l'admission	22
2.2.7	Autres problèmes addictifs au moment de l'admission	23
2.2.8	Consommation par injection avant l'admission	27
2.2.9	Données disponibles: sorties enregistrées et problème principal	29
2.3	Tableaux	30
Tableau 1	Problème principal, selon le sexe (admissions 2010)	30
Tableau 2	Répartition des hommes et des femmes à l'admission, selon le problème principal (2010)	30
Tableau 3	Distribution des âges à l'admission, selon le problème principal (2010)	31
Tableau 4	Âge à l'admission, selon le problème principal (2010)	33
Tableau 5	État civil à l'admission, selon le problème principal (2010)	34
Tableau 6	Nationalité à l'admission, selon le problème principal (2010)	35
Tableau 7	Degré d'urbanisation du lieu de domicile à l'admission, selon le problème principal (2010)	36
Tableau 8	Situation de domicile à l'admission, selon le problème principal (2010)	37
Tableau 9	Plus haute formation achevée à l'admission, selon le problème principal (2010)	38
Tableau 10	Source de revenu principale à l'admission, selon le problème principal (2010)	39
Tableau 11	Taux d'activité à l'admission, selon le problème principal (2010)	41
Tableau 12	Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal (2010)	43
Tableau 13	Type de prises en charge avant l'admission, selon le problème principal (2010)	44

Table des matières

Tableau 14	Principale instance d'envoi, selon le problème principal (admissions 2010)	46
Tableau 15	Fréquence de consommation avant l'admission, selon le problème principal (2010)	48
Tableau 16	Âge lors de la première consommation de la principale substance posant problème (admissions 2010)	49
Tableau 17	Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (admissions 2010)	50
Tableau 18	Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (admissions 2010)	51
Tableau 19	Autres problèmes addictifs à l'admission, selon le problème principal (2010)	52
Tableau 20	Injection de drogues illégales au cours de la vie, selon le problème principal (admissions 2010)	54
Tableau 21	Âge lors de la première injection, selon le problème principal (admissions 2010)	55
Tableau 22	Injection au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (admissions 2010)	56
Tableau 23	Echange de matériel d'injection au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2010)	57
Tableau 24	Problème principal, selon le sexe (sorties 2010)	58
Tableau 25	Répartition des hommes et des femmes à la sortie, selon le problème principal (2010)	58
Tableau 26	Distribution des âges à la sortie, selon le problème principal (2010)	59
Tableau 27	Âge à la sortie, selon le problème principal (2010)	61
Tableau 28	Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (sorties 2010)	62
Tableau 29	Raison principale de la fin de la prise en charge: destination des transferts, selon le problème principal (sorties 2010)	64
Tableau 30	Raison principale de la fin de la prise en charge: cause du décès, selon le problème principal (sorties 2010)	65
Bibliographie		67

1. Introduction

Le système de monitoring *act-info*, introduit en 2004, est le fruit de l'harmonisation des instruments des cinq statistiques sectorielles existantes dans le domaine du traitement des addictions. Ces instruments, développés dans des circonstances variables, n'offraient que peu de possibilités de comparaisons avant l'introduction d'*act-info*. Un pas décisif a été franchi avec l'adoption de standards unifiés et la création d'une banque de données centralisée rassemblant les données de base des cinq statistiques sectorielles. Cette banque de données commune est gérée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et permet une analyse comparative des caractéristiques des usagers de l'ensemble du système de prise en charge des dépendances. Le présent rapport décrit le développement et l'état actuel du projet global et présente une analyse des données *act-info* recueillies en 2010 pour l'ensemble de la Suisse.

1.1 Importance des systèmes de monitoring dans le domaine de l'aide aux personnes dépendantes

Au cours des trente dernières années, de nombreux pays ont mis en place des systèmes de monitoring dans le domaine du traitement des toxicomanies et de l'alcoolodépendance. Des normes internationales pour le relevé de telles données ont été développées au plan européen (EMCDDA 2000). L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) recommande d'ailleurs l'utilisation de ces standards (TDI: Treatment Demand Indicator) dans le monde entier (Donmall 2006).

De fait, la saisie systématique des caractéristiques des patients et patientes qui recourent aux prestations d'aide aux personnes dépendantes représente une des sources d'informations les plus importantes dans le domaine de l'abus de substances. Bien que ces statistiques ne portent que sur une partie de la population confrontée aux problèmes d'addiction, les informations recueillies constituent - hormis quelques enquêtes ponctuelles - le seul accès à ce groupe de

la population qui est souvent peu visible et marginalisé. Ainsi, les données de monitoring des traitements fournissent des indicateurs essentiels pour suivre l'évolution des problèmes d'addiction et les tendances de consommation. Enfin, elles servent également de référence pour la planification, la mise en place et l'adaptation des différentes prestations d'aide. De façon générale, un système de monitoring permet de mieux identifier les caractéristiques des groupes cibles particulièrement vulnérables aux problèmes de dépendance et d'évaluer les besoins en mesures préventives, thérapeutiques et d'accompagnement de manière plus adéquate. Les informations sur la nature et la quantité de substances consommées (fréquence, mode d'absorption, âge de la première expérience, etc.), mais aussi les données plus générales relatives au profil sociodémographique de la population prise en charge sont autant d'éléments pertinents.

En promouvant les activités de monitoring et en mettant en place un réseau d'information harmonisé dans le domaine du traitement des addictions, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) entend favoriser le développement et l'optimisation de mesures d'aide et de prévention fondées sur les évidences scientifiques.

1. Introduction

1.2 Le système de monitoring *act-info*

act-info (acronyme pour addiction, care and therapy information) est le système harmonisé de monitoring des usagers des structures du domaine de l'aide aux personnes dépendantes en Suisse. Ce système national de documentation porte sur les différentes offres de traitement ambulatoire et résidentiel des personnes ayant des problèmes liés aux substances légales ou illégales, ou souffrant de dépendances non liées à une substance. Les instituts de recherche impliqués (Addiction Info Suisse à Lausanne et ISGF à Zurich) sont responsables de la collecte et de l'exploitation des données dans les différents domaines de traitement. *act-info* est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui est également responsable du projet global.

1.2.1 Objectif d'*act-info*

L'objectif général d'*act-info* est l'établissement et l'exploitation d'un réseau unifié de statistiques et d'information dans le domaine de l'aide ambulatoire et résidentielle en matière de dépendance (conseil, accompagnement et traitement). Ce réseau a pour but de fournir une base d'informations aux praticiens et aux chercheurs ainsi qu'aux communes, aux cantons et à la Confédération. Cet objectif a été atteint grâce à l'harmonisation des instruments des cinq statistiques sectorielles existantes dans le domaine du traitement des addictions (pour plus de détails à ce sujet, voir Maffli et al. 2008). La collecte des données est assurée par les instituts de recherche responsables des différentes statistiques sectorielles. Les objectifs spécifiques peuvent être résumés comme suit:

- création d'un **réseau national d'information** par la collecte de données standardisées et ciblées concernant les personnes traitées pour des problèmes addictifs telles que les caractéristiques sociodémographiques ainsi que les données spécifiques aux problèmes de dépendance et aux modes de consommation
- **amélioration des connaissances** relatives aux personnes qui font appel aux infrastructures de prise en charge des problèmes addictifs par l'établissement des profils des client-e-s à l'admission et à la sortie
- **identification des tendances** à un stade précoce, s'agissant des caractéristiques des clientes et des clients en traitement, de leurs habitudes de consommation, de leur comportement addictif, ainsi que de leurs problèmes et de leurs besoins spécifiques
- **constitution d'une documentation** sur les structures du système d'aide aux personnes dépendantes et sur les différentes offres
- **transfert dans la pratique** grâce à une large diffusion des résultats, notamment par l'élaboration de rapports annuels standardisés pour les institutions qui livrent des données (rapports confidentiels), par la diffusion de résultats globaux au travers de différents rapports annuels (rapports spécifiques pour chaque domaine de traitement et rapport global sur les questions de base communes), et par une valorisation et un approfondissement des résultats dans le cadre de publications ou de manifestations thématiques
- **comparabilité avec d'autres pays** grâce à l'adoption des normes internationales du TDI (Treatment Demand Indicator, EMCDDA 2000). Les questionnaires *act-info* gardent en outre une compatibilité suffisante avec les instruments des statistiques sectorielles préexistantes pour permettre un suivi de l'évolution à long terme
- mise à disposition de **données de base pour mener des recherches approfondies** ou des études de suivi. Des sets de données issus de la banque de données centralisée peuvent être obtenus par des chercheurs ou chercheuses qui en font la demande. Des conditions cadres sont prévues à cet effet. Les instituts de recherche impliqués peuvent également exécuter des mandats de recherche.

De façon générale, le contenu et l'exploitation d'*act-info* cherchent à répondre aux besoins du terrain et de la recherche, ainsi qu'aux exigences de la Confédération et des cantons relatives aux tâches de santé publique.

1.2.2 Les instruments act-info

L'instrumentaire d'act-info est constitué d'un ensemble de questions posées au début et à la fin d'une prise en charge; il repose sur les cinq types de sources suivants:

- **Treatment Demand Indicator** Standard Protocol (TDI) de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA 2000, www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/tdi)
- **Dokumentationsstandards III** pour l'évaluation des traitements de personnes dépendantes (DG-Sucht 2001) de la «Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie»
- **Addiction Severity Index (ASI)** (McLellan et al. 1992)
- **questionnaires antérieurs** des statistiques sectorielles de la SAMBAD, de la SAKRAM/CIRSA, de la Ligue FOS, des traitements HeGeBe et de la statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone
- différents **tests de screening** standardisés comme l'AUDIT (Babor et al. 1992) et le test de Fagerström (Heatherton et al. 1991).

Les questions des relevés effectués à l'admission et à la sortie sont structurées de la manière suivante:

Questions de base: les instruments de collecte des données consistent en une série de questions imposées pour toutes les statistiques sectorielles d'act-info. Ces questions garantissent la compatibilité tant entre les différents domaines de traitement qu'avec les normes internationales (TDI, voir plus haut). Elles doivent être complétées pour tous les clients et les clientes au début et à la fin de la prise en charge.

Questions spécifiques aux secteurs de prise en charge: ces questions ne sont posées que dans un ou plusieurs domaine(s) de traitement mais y sont alors obligatoires. Il s'agit par exemple de questions relatives aux clientes ou aux clients qui font appel à un service ambulatoire en raison de problèmes de dépendance chez des proches – et qui ne sont dès lors pertinentes que dans le domaine ambulatoire – ou encore de questions au sujet de comportements délinquants, de condamnations ou de mesures pénales qui concernent essentiellement le traitement des personnes faisant usage de drogues illégales. Cette approche permet d'obtenir également des informations exhaustives sur des thèmes ciblés, ne concernant que des groupes particuliers.

Questions thématiques: ces questions ne sont posées que par certaines institutions d'un domaine de traitement précis et concernent, par exemple, un échantillon de la clientèle ou une période donnée (sur une année de référence, par exemple). Il s'agit en l'occurrence de thèmes liés aux dépendances tels que santé psychique, cures de sevrage, consommation de tabac ou troubles alimentaires. De nombreux modules thématiques ou spécifiques aux secteurs de prise en charge ont déjà été créés (23 pour l'entrée et 23 pour la sortie), et d'autres encore peuvent être élaborés si nécessaire.

1. Introduction

Les questionnaires d'entrée et de sortie *act-info* rassemblent au total quelque 90 **questions de base** bien documentées, qui couvrent les domaines suivants (voir aussi les pages Internet *act-info*: www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00632/03290/index.html?lang=fr):

Questionnaire d'entrée

Cadre de la prise en charge:

setting de traitement; date d'admission; propres problèmes addictifs ou problèmes chez des proches; traitements antérieurs pour problèmes addictifs; traitement de substitution en cours; instance d'envoi principale et secondaires.

Données sociodémographiques:

sexe, année de naissance; degré d'urbanisation du lieu de résidence; état civil; nationalité; conditions d'habitation; source(s) de revenus principale/complémentaire(s), activité professionnelle principale/complémentaire(s); formation terminée ou en cours.

Substances consommées, comportement addictif:

problème principal: fréquence, mode d'administration, âge lors de la première consommation, de la première consommation régulière, de la première consommation problématique; autres problèmes addictifs; comportement de consommation (ou comportement assimilable à une addiction) au cours du dernier mois; injection.

Questionnaire de sortie

Cadre de la prise en charge:

date de sortie; setting de traitement; propres problèmes addictifs ou problèmes chez des proches; type de sortie; substitution pendant et après le traitement.

Données sociodémographiques:

sexe, année de naissance; degré d'urbanisation du lieu de résidence; état civil; conditions d'habitation; source(s) de revenus principale/complémentaire(s), activité professionnelle principale/complémentaire(s); formation terminée ou en cours.

Substances consommées, comportement addictif:

problèmes lors de la sortie; comportement de consommation (ou comportement assimilable à une addiction) au cours du dernier mois; injection au cours du dernier mois.

1.2.3 Exploitations de routine et diffusion des résultats

Le système de documentation *act-info* prévoit des analyses annuelles standardisées qui sont effectuées à trois niveaux: chaque institution participante reçoit une analyse annuelle de ses propres données, chaque secteur de prise en charge dispose d'une statistique spécifique et le rapport global *act-info* présente une analyse de l'ensemble des données de base recueillies dans les différents secteurs. Ces prestations ainsi que les autres efforts de diffusion des résultats sont décrits plus en détail ci-dessous:

Rapports d'institution: dans les secteurs de prise en charge SAMBAD, *act-info-FOS*, *act-info-Residalc* et HeGeBe, chaque institution participante reçoit de l'institut de recherche responsable du secteur correspondant un rapport d'institution confidentiel relatif à sa clientèle de l'année de référence avec tableaux et/ou graphiques. Les données comprennent toutes les entrées et sorties qui ont eu lieu durant l'année civile (les éventuelles entrées multiples sont comptées plusieurs fois). Les rapports sont établis en français, allemand ou parfois en italien, selon l'établissement. Les résultats sont destinés à un usage interne (chiffres pour le rapport d'activités annuel, positionnement par rapport aux résultats de l'ensemble de la Suisse, évolution de la clientèle de l'institution, etc.). Si une institution le souhaite, il est aussi possible, après accord, de procéder à des évaluations spéciales basées sur les données de l'institution ou à des évaluations communes (p. ex. institutions d'un même canton). De son côté, la Statistique nationale de la méthadone offre aux cantons la possibilité de requêtes d'analyses interactives sur Internet (sous la forme d'analyses cantonales spécifiques).

Rapport par secteur de prise en charge: les instituts de recherche procèdent à une analyse annuelle des données pour chaque secteur de traitement. Ces rapports sectoriels incluent une analyse des aspects spécifiques au secteur concerné. Comme dans le cas des rapports d'institution, chaque épisode de prise en charge y est considéré comme une unité d'analyse. Ainsi, l'institution peut comparer ses propres données à celles du domaine de référence. Les rapports annuels des statistiques sectorielles *act-info-FOS*, SAMBAD et *act-info-Residalc* sont publiés en français et en allemand (et en partie aussi en italien) et une

version électronique est mise à disposition sur leurs sites Internet. De son côté, la statistique HeGeBe fournit actuellement à l'OFSP les chiffres nécessaires à l'élaboration de son rapport sectoriel, tandis que la Statistique nationale de la méthadone propose des requêtes d'analyses interactives sur Internet portant sur l'ensemble de la Suisse.

Rapport global d'*act-info*: la constitution d'une banque de données commune contenant les variables de base permet de procéder à des analyses globales. Le présent rapport est le septième rapport annuel (données 2010) sur l'ensemble des secteurs couverts par *act-info*. Les résultats sont présentés selon la principale substance posant problème, indépendamment du domaine de prise en charge. Contrairement à l'approche adoptée dans les rapports spécifiques aux secteurs de traitement ou aux institutions, où l'épisode de prise en charge constitue l'unité d'analyse, le rapport global d'*act-info* présente une statistique relative aux personnes, conformément aux recommandations du protocole TDI (EMCDDA, 2000). Cela signifie que plusieurs épisodes de prise en charge concernant une même personne au cours d'une même année sont comptabilisés ici comme une seule unité d'analyse (voir le point 2.1.3).

Communication des résultats: les instituts de recherche choisissent la forme appropriée pour diffuser les résultats dans leur secteur de traitement. Pour la statistique sectorielle *act-info-FOS*, par exemple, l'institut organise chaque année une rencontre durant laquelle les données annuelles, en partie sur un thème choisi, sont présentées et commentées en lien direct avec la pratique (un support imprimé est également fourni). Pour la statistique *act-info-Residalc*, l'institut de recherche participe, au besoin, à des rencontres organisées par les institutions en Suisse romande et en Suisse alémanique et communique des informations sur l'avancement du projet global *act-info* et sur *act-info-Residalc*. Dans le domaine ambulatoire, des séances peuvent être organisées sur demande des associations concernées pour présenter et discuter les résultats recueillis dans ce secteur de prise en charge.

1. Introduction

1.3 Statistiques sectorielles participantes: situation 2010

Comme évoqué plus haut, le système national de monitoring du traitement des addictions *act-info* comprend plusieurs domaines de prise en charge. Ces secteurs continuent de mener des statistiques spécifiques après leur harmonisation, conformément au concept modulaire des instruments et de publier des rapports sectoriels. En raison des conditions cadres différentes dans les cinq secteurs de prise en charge, la transition vers les nouveaux instruments et logiciels de saisie n'a pas pu avoir lieu partout immédiatement après l'introduction d'*act-info* en 2004. Ainsi, le domaine des traitements avec prescription d'héroïne (HeGeBe) a adopté les instruments *act-info* un an plus tard. Un bref aperçu des cinq statistiques sectorielles avec l'indication des références de leurs sites Internet respectifs est présenté ci-dessous dans l'ordre de leur passage aux normes *act-info*.

act-info-FOS: dirigée par le service de coordination *act-info-FOS* de l'ISGF, la Ligue pour l'évaluation de traitements résidentiels de la toxicomanie (aujourd'hui *act-info-FOS*) regroupe des établissements offrant des traitements résidentiels aux personnes dépendantes de drogues. Regroupant à sa création en 1989 quatre établissements, l'Association pour la recherche en établissement thérapeutique est devenue en 1995 la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie (FOS), bénéficiant d'une large représentation. Le passage à *act-info*, qui a eu lieu le 1^{er} janvier 2003 déjà avec les instruments d'alors (questionnaires sur papier), a également servi d'ultime phase test pour le projet global. L'année suivante, la possibilité d'une saisie par Internet était offerte. On compte quelque 60 établissements offrant des traitements résidentiels pour des problèmes liés à des substances illégales. En 2010, ils étaient 50 à participer au réseau de recherche, dont 44 ont livré des données. En sus des établissements thérapeutiques, quelques appartements protégés et programmes de placement familiaux participent également au monitoring. La description du projet, la liste des publications et les rapports annuels sont disponibles sur Internet sous le lien www.isgf.ch (ensuite Projekte > Aktuelle Projekte > *act-info-FOS*).

act-info-Residalc: la statistique SAKRAM/CIRSA (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Kliniken und Rehabilitationszentren für Alkohol- und Medikamentenabhängige / Conférence des institutions romandes spécialisées en alcoologie), appelée maintenant *act-info-Residalc*, est réalisée par Addiction Info Suisse et couvre des établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse. SAKRAM/CIRSA a débuté en 1984 en Suisse alémanique et en 1992 en Suisse romande. On compte environ une vingtaine d'établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 16 ont participé au monitoring de la clientèle en 2010. La plupart sont des centres de réhabilitation et des cliniques spécialisées. Le passage à *act-info* a eu lieu le 1^{er} janvier 2004. La description du projet et les rapports annuels peuvent être consultés à l'adresse suivante: www.addiction-info.ch (ensuite Recherche scientifique > *act-info-Residalc*).

SAMBAD: la statistique du secteur ambulatoire de l'aide psychosociale en matière de dépendance (SAMBAD) est également réalisée par Addiction Info Suisse. Elle concerne aussi bien les centres de consultation spécialisés dans la prise en charge de problèmes addictifs que les services polyvalents qui suivent, en plus d'autres groupes de client-e-s, également des personnes ayant un problème de dépendance. SAMBAD a été lancé en 1994 avec une phase pilote et poursuivi par un relevé systématique dès 1995 sous la responsabilité de l'Office fédéral de la statistique. Depuis le passage à *act-info* le 1^{er} janvier 2004, la collecte des données est effectuée directement par Addiction Info Suisse. En 2010, on enregistrait en Suisse 206 établissements dans ce secteur, dont plus de la moitié traitent exclusivement de problèmes de dépendance (62.6%). La participation au monitoring s'est stabilisée au cours des trois dernières années après une période d'augmentation. On comptait 80 services participants en 2010, dont 78 ont livré leurs données à temps pour les analyses présentées dans ce rapport. La description du projet et les rapports annuels se trouvent à l'adresse suivante: www.addiction-info.ch (ensuite Recherche scientifique > *act-info SAMBAD*).

HeGeBe: le monitoring des traitements avec prescription d'héroïne (HeGeBe) est mené par l'ISGF et regroupe en 2010 23 établissements de traitement ambulatoire, dont deux programmes de distribution en milieu carcéral. Pour intégrer le programme, il faut être héroïnomanie depuis plus de deux ans (selon CIM-10), être majeur, avoir échoué dans ses tentatives de traitement et avoir subi des atteintes dans sa santé et/ou sa vie sociale du fait de sa consommation. La statistique HeGeBe, alors baptisée PROVE (abréviation de l'allemand Projekt für eine ärztliche Verschreibung von Betäubungsmitteln) a débuté en 1994 à titre d'essai. A partir de 1998, le traitement avec prescription d'héroïne a été adopté en tant que possibilité de traitement de routine dans le système suisse de traitement des personnes dépendantes aux opiacés. La participation des centres HeGeBe au système de monitoring des client-e-s, qui a été intégré le 1^{er} janvier 2005 à *act-info*, est obligatoire. La description du projet et la liste de publications se trouvent à l'adresse suivante: www.isgf.ch (ensuite Projekte > Aktuelle Projekte > Monitoring Heroingesetzte Behandlung [act-info HegeBe]).

Statistique nationale de la méthadone: la statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone est effectuée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et concerne principalement les établissements de traitement avec prescription de méthadone, les médecins généralistes, les médecins cantonaux, les médecins travaillant en cabinet et les pharmacies. La phase pilote a débuté en 1997 et à partir de 1999, la collecte systématique de données était rendue possible grâce aux instruments (questionnaires, logiciels) mis à disposition par l'OFSP. Les données sont recueillies par les médecins cantonaux dans le cadre de l'obligation d'autorisation à laquelle les traitements de substitution sont soumis. En 2010, 12 cantons utilisaient les questionnaires et logiciels et étaient en mesure de mettre à disposition de la statistique nationale des données individuelles anonymisées. Certains cantons disposent de leur propre système informatisé de collecte des données et peuvent transmettre des données agrégées ou individuelles et anonymes. Cependant, le volume de ces données est restreint et leur compatibilité avec les normes *act-info* est limitée. A la différence de SAMBAD, *act-info-Residalc* et *act-info-FOS*, la statistique des traitements avec prescription de méthadone se compose généralement, en plus

des données d'entrée et de sortie, de données sur le déroulement du traitement recueillies chaque année auprès des patients et patientes. Celles-ci reposent sur la prolongation de l'autorisation délivrée par le médecin cantonal. L'introduction des instruments d'*act-info* doit être approuvée par chaque autorité cantonale (médecins cantonaux) et n'a pas pu être réalisée pour l'instant. Par contre, toutes les données compatibles avec *act-info* sont converties aux standards officiels et intégrées à la banque de données centralisée. La page Internet www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00632/06217/index.html?lang=fr présente une description du projet et permet de consulter les résultats selon des requêtes d'analyse interactives.

1.4 Autres domaines de l'aide aux personnes dépendantes

Outre les secteurs de prise en charge qui participent au monitoring *act-info*, il existe d'autres offres d'aide aux personnes dépendantes, qui sont décrites brièvement ici:

Cliniques privées et cliniques psychiatriques ayant une unité 'dépendances': les cliniques privées ne sont pour l'instant pas concernées. Il en va de même des unités psychiatriques ayant une offre de prise en charge pour problèmes de dépendances, car elles participent déjà à la Statistique suisse des hôpitaux (Office fédéral de la Statistique).

Sevrage: ce domaine comprend les traitements ambulatoires et résidentiels pratiquant le sevrage, les centres de désintoxication spécialisés, le sevrage en milieu hospitalier ou en clinique psychiatrique. En règle générale, le sevrage physique est une étape préliminaire à une demande de suivi entrant directement dans la cible d'*act-info*.

Offres à bas seuil pour la réduction des risques: cette catégorie regroupe diverses formes telles que travail de rue (travail social «hors murs»), foyers d'urgence, locaux d'injection, programmes de distribution ou d'échange de seringues, structures d'accueil de jour, où les mesures sociales ou sanitaires sont appliquées sans exigence de modification de la consommation des personnes concernées. Un recensement systématique des client-e-s de ce secteur, tel qu'*act-info* le prévoit, ne serait que difficilement réalisable du fait que l'accès à ce type d'offre est libre et anonyme.

1. Introduction

Foyers: en font partie les ateliers et les offres d'hébergement et de soins destinées aux personnes confrontées à un problème de toxicomanie ou d'alcoolodépendance. Ces structures font office soit de posture ou de solution intermédiaire, soit de lieu de vie pour des personnes qui ne peuvent pas être resocialisées.

Appartements protégés: ce domaine comprend des offres très diverses de posture résidentielle prenant le relais au terme d'une thérapie. Une partie est prise en compte dans la statistique *act-info-FOS* si l'offre est proposée dans le cadre du concept de traitement adopté par une institution thérapeutique.

Traitement des dépendances en milieu carcéral: il s'agit de la remise de méthadone ou d'autres produits de substitution dans les prisons, lorsqu'elle n'est pas déjà intégrée dans les statistiques sectorielles que sont la statistique nationale de la méthadone et HeGeBe.

1.5 Saisie des données

Des questionnaires imprimés destinés au monitoring de la clientèle sont disponibles dans tous les domaines de traitement. Dans la plupart des secteurs, les données peuvent également être saisies électroniquement. Les questionnaires *act-info* spécifiques aux différents domaines (y compris les questions ciblées correspondantes) ainsi que les manuels et les autres documents sont pour la plupart disponibles en trois langues et peuvent être téléchargés sur les sites web correspondants. Ces documents peuvent être consultés au moyen des liens suivants:

SAMBAD

www.addiction-info.ch (ensuite Recherche scientifique > act-info SAMBAD puis sous Publications & téléchargements)

act-info-Residalc

www.addiction-info.ch (ensuite Recherche scientifique > act-info-Residalc puis sous Publications & téléchargements)

act-info-FOS

www.isgf.ch/ (ensuite Projekte > Aktuelle Projekte > act-info-FOS puis sous Instrumente: > act-info-FOS Fragebogen)

HeGeBe

www.isgf.ch/ (ensuite Projekte > Aktuelle Projekte > Monitoring Heroingestützte Behandlung [act-info HeGeBe])

Pour la **Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone**, des formulaires cantonaux sont utilisés. Un logiciel est en outre mis à disposition par l'OFSP pour la gestion des autorisations de prescription et pour la saisie électronique des données.

Afin de garantir l'homogénéité du contenu des outils de saisie, des spécifications uniques (format XML) ont été élaborées en allemand, français et italien pour toutes les questions définies et les explications correspondantes (questions de base et autres questions). Ces spécifications XML sont gérées par la direction du projet global au moyen d'un logiciel adapté et sont à disposition des instances intéressées. Ainsi, des sociétés privées de développement de logiciels destinés à la gestion de la clientèle peuvent par exemple reprendre ces spécifications. Dans des applications compatibles avec le format XML, elles peuvent même être utilisées directement. Un groupe de travail a été constitué parmi les acteurs concernés (développeurs informatiques, interlocuteurs techniques des statistiques sectorielles) pour assurer la qualité technique d'*act-info* sur le plan informatique. Ce groupe de travail (ITSG *act-info*) veille à l'adoption de standards appropriés tant du point de vue technique qu'économique, à l'harmonisation des différentes approches d'implémentation logicielle ainsi qu'à la documentation des normes établies. Grâce à la souplesse d'utilisation des spécifications, différents outils de saisie sont à disposition des institutions. Des solutions sans frais pour les institutions participantes ont été développées jusqu'ici et sont à disposition:

- Sur mandat de la direction du projet global, un masque de saisie (**act-info PC**) aussi simple que convivial a été élaboré pour tous les domaines de traitement. Ce masque convertit directement les spécifications XML en formulaire électronique. Les fastidieuses reprogrammations nécessaires en cas de modification des questions sont donc caduques. Cette application présente en outre l'avantage d'être utilisable comme solution indépendante ou alors comme module interactif intégré dans un système de gestion de clientèle déjà en place. Une nouvelle version a été introduite en 2007 et une mise à jour garantissant la compati-

bilité avec les nouveaux systèmes d'exploitation a été effectuée en 2011.

- *act-info-FOS* met le logiciel **DataPool** à la disposition des institutions participantes, qui peuvent ainsi saisir les données de leur clientèle directement par le biais d'Internet. Le logiciel comprend des procédures préalables de filtrage et de vérification, qui améliorent la qualité des données (plausibilité, exhaustivité). Actuellement, un peu plus de la moitié des institutions participant à *act-info-FOS* saisissent leurs données en ligne.
- Dans le domaine ambulatoire, une application basée sur **EpiData** a été développée. Elle comprend elle aussi des procédures de filtrage et de vérification. Les institutions intéressées peuvent également disposer d'un module d'exploitation (EpiData Analysis) qui, outre les analyses courantes, permet aussi des exploitations plus complexes.
- Dans le domaine de la méthadone, une application spécifique pour l'administration des autorisations de prescription de méthadone est à disposition des médecins cantonaux ou de leurs services. Ce logiciel, fonctionnant sous **Access**, est un outil qui sert d'une part à l'administration des autorisations et d'autre part à la saisie des questionnaires de la statistique méthadone tels qu'ils existent déjà. Toutefois, le nouveau questionnaire «*act-info* méthadone» n'a jusqu'ici été installé dans aucun canton.

Par ailleurs, des sociétés informatiques commercialisent des systèmes complets de gestion de la clientèle intégrant les modules de questions d'*act-info*. Ces modules ont été établis sur la base des spécifications ou en utilisant l'interface d'*act-info* PC. Ils peuvent, le cas échéant, également mettre à jour les questionnaires d'*act-info* sans problème.

1. Introduction

1.6 Protection des données

Les données recueillies au niveau des institutions d'aide aux personnes dépendantes comprennent des caractéristiques personnelles relatives aux clients et clientes qui doivent être protégées.

Pour empêcher l'identification immédiate des personnes concernées, les données sont pseudonymisées avant d'être transmises à l'institut de recherche compétent. Ainsi, c'est un code de quatre lettres généré à partir de positions définies de lettres du nom (de naissance) et du prénom et non pas les noms et prénoms des client-e-s qui sont transmis. Cette opération est effectuée de manière automatique par les différents outils de saisie et les institutions qui n'en disposent pas peuvent avoir recours à un petit utilitaire informatique. Comme les données fournies contiennent encore certaines indications sensibles, telles que le domicile, la date de naissance et le numéro d'identification de l'institution, leur transmission doit aussi être protégée de manière adéquate. A ce niveau, la protection nécessaire est garantie soit par l'envoi postal (secret postal), soit par l'encodage des données transmises électroniquement suivant une procédure appropriée.

Les instituts de recherche s'engagent à traiter les données reçues de manière absolument confidentielle et à ne les utiliser qu'à des fins statistiques conformes au mandat et aux prescriptions de l'OFSP. En particulier, aucune donnée pouvant permettre d'identifier des personnes par recoupement n'est transmise plus loin ou publiée.

La sûreté de la gestion des données auprès des instituts de recherche est garantie par l'utilisation de serveurs modernes, dont l'accès est impossible aux personnes non autorisées, que ce soit via le réseau ou via les postes de travail internes.

Pour l'établissement de la banque de données commune auprès de l'Office fédéral de la santé publique, les instituts de recherche transmettent les données des secteurs de prise en charge respectifs après plusieurs encodages. En premier lieu, toutes les variables à caractère sensible sont soit supprimées soit converties en variables ne présentant plus ce caractère. Ainsi, les indications de domicile sont traduites en classes de degré d'urbanisation. De la date de naissance, seule l'année est conservée. Le numéro d'identification de l'institution et le code interne des clients et clientes ne sont pas transmis. Et même le code de quatre lettres généré au niveau de l'institution n'est pas transmis en l'état. Pour que, comme le préconisent les recommandations du protocole TDI (EMCDDA 2000), plusieurs épisodes de prise en charge concernant une même personne puissent être identifiés comme tels, un identifiant unique est constitué pour chaque personne avant la transmission des données. On a recours pour cela à une procédure d'encodage en deux temps, combinant la date de naissance, le sexe et le code de quatre lettres. Cette procédure génère d'abord deux éléments de code ne permettant pas de retourner à l'information d'origine (l'encodage des mêmes données à des moments différents aboutit toujours à des paires de codes différents). Ces deux éléments ne peuvent être codés en identifiant unique qu'au niveau de la banque de données centralisée de l'OFSP à l'aide d'une clé confidentielle. Ce code ne permet pas non plus de remonter aux informations initiales. La description technique détaillée de la procédure d'encodage peut être demandée auprès de la direction du projet global.

Ces mesures garantissent que la banque de données commune contenant les variables de base ne comprend aucune information relevant de la protection des données.

2. Clientes et clients des secteurs ambulatoire et résidentiel en 2010

Par la mise en commun des données récoltées selon des normes unifiées dans les secteurs du traitement résidentiel (*act-info-FOS* et *act-info-Residalc*), dans le secteur ambulatoire de l'aide psychosociale (SAMBAD) et dans le secteur du traitement par prescription d'héroïne ainsi que par l'intégration des données de la Statistique nationale de la méthadone compatibles avec *act-info*, une banque de données commune a été constituée, conformément aux objectifs d'*act-info*. Celle-ci permet de décrire les usagers du système d'aide en matière de dépendance tout entier. Les résultats présentés dans ce deuxième chapitre sont issus de l'analyse des données récoltées en 2010 au moment de l'admission et de la sortie dans les secteurs de prise en charge participants.

2.1 Aspects méthodologiques

De façon à permettre une bonne lecture des résultats et d'éviter des interprétations erronées, quelques questions méthodologiques fondamentales sont évoquées en guise de préalable à ce chapitre. Une première question concerne le degré de couverture des statistiques sectorielles participantes et le problème que posent les données manquantes. Un deuxième point à relever est celui des options prises par rapport à l'unité d'analyse et aux sous-groupes choisis (variables indépendantes). Enfin, des aspects concernant les thèmes traités (variables dépendantes) seront précisés.

2.1.1 Degré de couverture

Si le système de monitoring *act-info* est conçu pour permettre un recensement exhaustif, la participation reste toutefois généralement facultative pour les institutions de traitement et ne peut par conséquent pas être garantie. Seuls les centres HeGeBe ont l'obligation de participer au relevé. Dans le secteur des traitements substitutifs, des demandes doivent être déposées auprès des médecins cantonaux qui recueillent ainsi au moins des données de base et les transmettent ensuite à la Statistique nationale de la méthadone. Par ailleurs, certains cantons obligent les institutions à participer à un système de documentation standardisé. De façon générale, les institutions participantes contribuent aux efforts de recherche en apportant leur propre motivation et en y affectant des ressources en personnel. Les institutions ne

disposant que de ressources limitées, dont la clientèle fluctue fortement, ou encore dont les contacts avec cette dernière sont brefs, pourront juger qu'une collecte systématique des données de leurs client-e-s demande un travail trop important.

La participation des différents secteurs de prise en charge au monitoring de la clientèle en 2010 n'est pas homogène:

Le secteur du traitement avec prescription d'héroïne (HeGeBe) enregistre un taux de couverture de 100% en raison de l'obligation de participer à laquelle sont soumis les centres concernés.

Les taux de participation des deux secteurs résidentiels sont nettement plus élevés que celui du secteur ambulatoire. Ainsi, 44 établissements résidentiels spécialisés dans le traitement des problèmes liés à l'abus de drogues sur un total d'environ 60 ont participé à *act-info-FOS* (soit 73%) et 16 des 21 établissements résidentiels spécialisés dans le traitement des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments ont participé à *act-info-Residalc* (76%). En comparaison, seulement 38% (78 sur 206) des centres ambulatoires (spécialisés ou polyvalents) ont participé au monitoring SAMBAD en 2010. Ce sont deux centres de moins que l'année précédente. Cependant, le nombre total de services a également diminué si bien que le taux de participation n'a pratiquement pas changé. Deux autres institutions n'ont pas pu livrer leurs données à temps en raison d'ennuis techniques.

En 2010, 12 cantons ont participé à la Statistique nationale de la méthadone et ont livré des données individuelles. Dans le secteur des traitements substitutifs, les variables *act-info* ne sont cependant pas toutes récoltées, si bien que certains thèmes ne sont pas couverts. Les cantons restants n'ont fourni que des données agrégées ou des données ne pouvant pas être intégrées dans la banque de données générale d'*act-info*.

Le taux de participation des institutions ne représente toutefois qu'une approximation du taux de couverture effectif, puisque le nombre total de personnes traitées reste inconnu.

2. Clientes et clients des secteurs ambulatoire et résidentiel en 2010

A long terme, *act-info* vise à couvrir largement, voire même totalement, les divers secteurs de traitement des addictions. Une couverture incomplète par ce système de monitoring peut poser problème pour la généralisation des résultats, en particulier si le nombre de cas enregistrés est insuffisant et/ou que des distorsions systématiques amènent à douter de la représentativité des cas saisis. Il apparaît toutefois peu probable que les données disponibles présentent de graves distorsions. La décision de participer ou non au monitoring ne semble en effet guère liée au profil de la clientèle des centres respectifs. Le nombre de clients et clientes dont les données peuvent être analysées, compris entre N=4187 et N=8874 selon la question, s'avère suffisant (don-

nées concernant l'admission; sous-questions filtrées exclues). Il convient néanmoins d'interpréter les résultats avec prudence, car les données ne peuvent garantir une représentativité strictement contrôlée de la population visée. Le tableau ci-dessous présente une vue d'ensemble de la participation pour l'année 2010.

Participation des institutions à *act-info*, selon le secteur de prise en charge (2010)

	Institutions existantes (N)	Participation (n)	Participation (%)
HeGeBe	23	23	100%
FOS	environ 60	44	73%
Residalc	21	16	76%
SAMBAD	206	78	38%
	Cantons ayant une offre de substitution à la méthadone (N)	Cantons disposant de données individuelles (n)	Participation (%)
Méthadone	26	12	46%

2.1.2 Données manquantes

De façon générale, des données manquent lorsque des questions sont oubliées par inadvertance, qu'une personne refuse de répondre ou ne sait pas comment répondre à une question. Cependant, en ce qui concerne les données exploitées ici, une partie des données manquantes sont dues à une compatibilité encore incomplète des questionnaires (principalement dans le secteur des traitements substitutifs et pour quelques cas aussi dans le secteur ambulatoire). Il manque ainsi un nombre considérable de données pour plusieurs questions, un point qu'il est donc important de relever.

Les données manquantes sont systématiquement exclues des analyses auxquelles il est procédé pour le présent rapport. Mais leur nombre est indiqué pour tous les groupes et sous-groupes analysés et devrait être impérativement pris en compte pour interpréter les résultats. L'exclusion des données manquantes part du point de vue que celles-ci révéleraient une répartition similaire aux données disponibles, si leurs valeurs étaient connues. Même si cette hypothèse paraît plausible, il convient d'interpréter avec une prudence toute particulière les résultats pour lesquels le taux de données manquantes est sensiblement élevé. La remarque vaut en particulier pour le sous-groupe des personnes pour qui les opiacés constituent le problème principal, car dans le domaine des traitements substitutifs de nombreux thèmes ne font pas encore l'objet d'un relevé.

2.1.3 Unité d'analyse et données utilisées

Conformément au protocole TDI (EMCDDA 2000, Donmall 2006), les exploitations annuelles portant sur l'ensemble des secteurs de prise en charge ont les personnes pour unité d'analyse. Autrement dit, contrairement à ce qui se fait pour les analyses spécifiques à un secteur, une personne ayant été prise en charge à plusieurs reprises au cours de l'année de référence n'est comptabilisée ici qu'une seule fois. Pour cela, il a fallu introduire un identifiant unique (voir le chapitre 1.6) valable pour tous les secteurs de prise en charge et complètement anonymisé. Celui-ci permet en principe d'identifier les épisodes de prise en charge parallèles ou répétés concernant une même personne au cours de l'année considérée. Pour l'analyse des données relatives aux admissions, la statistique prend en considération, en cas de prises en charge multiples, la dernière entrée en date. Pour l'analyse des données relatives aux sorties, le principe est analogue: c'est la dernière sortie enregistrée durant l'année civile qui est prise en compte. Il faut toutefois partir du point de vue qu'un certain nombre de prises en charge parallèles ou répétées ne peuvent pas être identifiées comme telles, car les éléments nécessaires pour générer l'identifiant unique font parfois défaut. Par ailleurs, des erreurs au niveau des données qui servent à générer ce code ne sont pas totalement exclues. Dans les limites exposées ci-dessus, le tableau suivant présente le nombre de personnes enregistrées par chaque statistique sectorielle et concernées par au moins une admission ou une sortie durant l'année 2010.

Clientes et clients (proches exclus) enregistrés à l'admission et à la sortie, par statistique sectorielle (2010)

	FOS		HeGeBe		Méthadone		SAMBAD		Residalc		act-info	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Entrée												
hommes	451	75.7	91	76.5	614	74.9	4'374	72.4	804	61.9	6'334	71.4
femmes	145	24.3	28	23.5	206	25.1	1'667	27.6	494	38.1	2'540	28.6
Total	596	100.0	119	100.0	820	100.0	6'041	100.0	1'298	100.0	8'874	100.0
données manquantes	0		0		0		0		0		0	
Sortie												
hommes	352	72.3	103	76.9	341	72.1	4'001	72.3	814	62.1	5'611	70.7
femmes	135	27.7	31	23.1	132	27.9	1'534	27.7	497	37.9	2'329	29.3
Total	487	100.0	134	100.0	473	100.0	5'535	100.0	1'311	100.0	7'940	100.0
données manquantes	0		0		0		117		0		117	

2. Clientes et clients des secteurs ambulatoire et résidentiel en 2010

Rappelons que ces chiffres (exception faite du secteur HeGeBe) ne reflètent pas la totalité de la demande de prise en charge liée à des problèmes de dépendance en 2010 mais constituent plutôt un fragment de celle-ci, tributaire de la participation des institutions aux relevés (voir le chapitre 2.1.1).

En outre, il faut souligner que les données recueillies dans le secteur ambulatoire et relatives aux personnes venues consulter pour les problèmes d'un proche ne sont pas prises en compte ici puisqu'elles ne concernent que ce secteur. Les analyses qui s'y rapportent sont présentées dans le rapport annuel de la statistique SAMBAD (Astudillo et al. 2011).

La statistique ne permet pas encore de tirer des conclusions précises – excepté pour le secteur HeGeBe – quant à l'effectif de la clientèle des institutions qui y participent. Les résultats exposés dans ce rapport ne se réfèrent donc strictement qu'aux entrées et aux sorties enregistrées durant la période d'observation. Pour évaluer l'effectif des client-e-s pris en charge dans les différents secteurs de traitement des dépendances, une estimation du nombre de client-e-s en traitement au cours d'un jour-type a été entreprise en 2006 sur la base des données à disposition (HeGeBe: nombre effectif) et des informations relatives au taux de participation (date de référence: 30.09.2006). Les résultats de ces estimations sont présentés dans le tableau ci-dessous:

Estimation de l'effectif des client-e-s du système de prise en charge des dépendances (date de référence: 30.09.2006)

	Nombre de client-e-s
HeGeBe	1'264
FOS	700
Residalc	550
SAMBAD	21'500
Méthadone	17'000
Total (arrondi)	41'000

Il faut compter avec des marges d'erreurs assez larges pour chacun des chiffres estimés. C'est la raison pour laquelle les nombres ont été arrondis et qu'une actualisation de l'estimation n'apporterait pas plus de précision. Si l'on met en commun les estimations relatives aux cinq secteurs de prise en charge participant à *act-info*, on obtient un chiffre global de plus de 40'000 personnes en traitement. Le nombre des personnes bénéficiant d'un accompagnement psychosocial ou d'une thérapie dans les autres secteurs de prise en charge (offres à bas seuil, sevrage, psychiatrie, foyers, appartements protégés, etc.) peut, quant à lui, être estimé entre 5'000 et 10'000.

2.1.4 Sous-groupes (variables indépendantes)

Pour les exploitations statistiques standardisées, il est apparu judicieux de pratiquer une distinction par sexe d'une part, et par problème principal d'autre part. Par conséquent, les résultats sont toujours présentés séparément pour chaque sexe. Par ailleurs, la présentation par catégories de substances posant principalement problème est aussi parue appropriée puisque les variables dépendantes – en premier lieu celles relatives au mode de consommation – ne peuvent être interprétées de manière adéquate qu'en lien avec la substance ou la catégorie de substances concernée. La présentation des résultats par secteur de prise en charge n'a pas été jugée nécessaire dans la mesure où des analyses propres aux secteurs sont déjà disponibles et qu'il est déjà possible de procéder à des comparaisons à ce niveau (voir le point 1.2.3). Les résultats relatifs aux sorties sont également présentés selon la principale substance posant problème et c'est la substance indiquée au moment de l'admission qui est prise en compte.

Cette présentation des résultats par problème principal se retrouve dans d'autres systèmes de monitoring, comme

- en Allemagne (www.suchthilfestatistik.de)
- aux Pays-Bas (www.sivz.nl/ivz-verslavingszorg/ladis/nieuws-en-publicaties/kerncijfers)
- ou aux USA (<http://www.dasis.samhsa.gov/webt/quicklink/US09.htm>).

Si la cocaïne et l'héroïne sont consommées simultanément («cocktail») et que ce mélange est mentionné comme problème principal, ce type de consommation sera classé dans la catégorie de substance principale «opiacés», conformément aux normes européennes du TDI (EMCDDA 2000). Dans d'autres cas de polytoxicomanie, on cherche à identifier quelle est la substance qui pose subjectivement le plus de problèmes. Les personnes enregistrées dans la Statistique nationale de la méthadone ou de HeGeBe ont par principe l'héroïne pour principal problème, puisque la dépendance à cette substance est – logiquement – le facteur principal menant à ces traitements.

Les exploitations standardisées ne retiennent que les quatre catégories les plus importantes de principales substances posant problème. Ensemble, ces catégories représentent 93% de toutes les admissions. Il s'agit des catégories suivantes:

1. alcool
2. opiacés (héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail)
3. cocaïne (y compris crack et freebase)
4. cannabis

Les cas enregistrés dans les sous-groupes plus petits sont nettement moins nombreux, ce qui limite considérablement les possibilités d'analyse. Ainsi, le profil des clients et clientes enregistrés en 2010 qui ont indiqué les stimulants, la MDMA, les hallucinogènes, les médicaments, le tabac ou d'autres substances comme principal problème n'est pas analysé en détail. Cela s'applique aussi aux clients et clientes ayant principalement des troubles non liés à une substance, tels que les troubles du comportement alimentaire, le jeu pathologique et d'autres comportements assimilables à une addiction, qui sont également pris en compte par *act-info*.

2. Clientes et clients des secteurs ambulatoire et résidentiel en 2010

2.1.5 Variables cibles (variables dépendantes)

Le choix des thèmes faisant l'objet d'analyses repose sur les variables de base communes aux différents secteurs de prise en charge. Celles-ci découlent en grande partie des priorités définies par le protocole TDI.

Comme il est fréquent que les client-e-s du secteur résidentiel aient préalablement suivi une cure de sevrage, il était important que les questions relatives à leur situation et à leur mode de consommation avant leur admission ne se réfèrent pas uniquement aux 30 jours, mais aussi aux 6 mois précédant le début de la prise en charge. Ainsi, il est possible d'appréhender la situation globale des personnes et leur problématique avant l'intervention et non pas celle prévalant lors d'un éventuel traitement préliminaire. Pour assurer la comparabilité entre les secteurs, les analyses présentées ici se réfèrent – là où les données sont disponibles – à la période plus étendue.

Pour les questions admettant plusieurs réponses (p. ex. instance ayant adressé la personne à l'institution), *act-info* demande généralement d'abord quelle est la catégorie la plus significative (p. ex. l'instance d'envoi principale). Les présentes analyses concernent essentiellement les réponses données pour la catégorie principale.

2.1.6 Procédures d'analyse

En règle générale, ce rapport annuel se base sur des analyses descriptives qu'il présente sous forme de tableaux à double entrée indiquant les pourcentages par colonne et les nombres de cas correspondants. Le nombre total de personnes dans chacun des sous-groupes est toujours mentionné («N»). Il en va de même pour les données manquantes, qui sont exclues des analyses. Comme cela a déjà été précisé, le système de monitoring est conçu comme un recensement. C'est pourquoi il n'a été procédé à aucun échantillonnage. Bien que le taux de couverture ne soit pas encore optimal dans tous les secteurs de prise en charge, la population enregistrée par *act-info* ne peut pas être considérée comme un échantillon de la population ciblée (personnes prises en charge pour des problèmes de dépendance). On renoncera donc partout à recourir à des tests de signification puisque ces tests ne sont valables en principe que pour de véritables échantillons.

Pour les variables continues (p. ex. âge), des paramètres de position (moyenne et valeur médiane) sont

fournis ainsi que des paramètres de dispersion (écart-type, quartiles supérieur et inférieur).

Les résultats reflètent le profil de la clientèle des institutions participantes et ne peuvent pas sans autre être généralisés à l'ensemble de la population cible.

2.2 Résultats

Le présent sous-chapitre expose d'abord les principaux résultats issus des données *act-info* 2010 récoltées lors de l'admission ou de la sortie des client-e-s. Il présente ensuite également l'ensemble des résultats des analyses standardisées sous forme de tableaux.

2.2.1 Données disponibles: admissions enregistrées et problème principal


Le graphique 1 présente la répartition des problèmes principaux au sein de la clientèle enregistrée par *act-info* en 2010. Il s'agit de problèmes liés à une substance ou de problèmes assimilables à une addiction tels que le jeu pathologique. En ce qui concerne les problèmes liés à une substance, l'héroïne, la méthadone, les autres opiacés et les 'cocktails' (usage simultané d'héroïne et de cocaïne) sont regroupés sous la catégorie 'opiacés'. De la même façon, la catégorie 'cocaïne' réunit la cocaïne, la freebase (cocaïne base) et le crack (sel de cocaïne, chlorhydrate de cocaïne et bicarbonate).

La couverture du système de monitoring étant encore incomplète, il n'est pas possible de garantir que la répartition obtenue reflète la situation effective au sein de la population cible. Ainsi, seuls les chiffres absolus sont mentionnés.

Le graphique 1 montre que l'alcool est la principale substance posant problème la plus souvent mentionnée au début de la prise en charge ambulatoire ou résidentielle. Il est suivi par les opiacés, le cannabis et la cocaïne (y compris dérivés). Au total, ces quatre catégories de substances représentent 93% des problèmes principaux enregistrés par *act-info*.

Les hallucinogènes (par exemple le LSD) et les substances volatiles ne sont signalés comme problème principal que par quelques client-e-s. Les substances qui ne constituent que rarement le problème principal peuvent néanmoins jouer un rôle en tant que problème secondaire (voir le point 2.2.7).

Graphique 1
Problème principal à l'admission, selon le sexe (2010)



Nombres de clients et clientes (N):
 hommes: N=6325; femmes: N=2538

Total N=8863

Données manquantes:
 hommes: N=9; femmes: N=2

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase


*** Médicaments = barbituriques, benzodiazépines, autres somnifères et tranquillisants

2. Clientes et clients des secteurs ambulatoire et résidentiel en 2010

2.2.2 Répartition hommes/femmes selon le problème principal au moment de l'admission

Le graphique 2 montre la répartition hommes/femmes dans les quatre catégories de principales substances posant problème les plus souvent mentionnées. Les femmes sont nettement sous-représentées dans toutes ces catégories. Leur présence est la plus marquée dans le groupe 'alcool' (30.7%), et la plus faible dans le groupe 'cannabis', avec 14.2%.

Graphique 2
Clientes et clients enregistrés à l'admission, selon le problème principal (2010)




* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)
** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

2.2.3 Âge moyen des client-e-s au moment de l'admission

Le graphique 3 présente l'âge moyen des client-e-s au moment de leur admission, selon la catégorie de substance posant le problème principal.

Le groupe de client-e-s ayant l'alcool pour problème principal est, avec un âge moyen de 44.0 ans pour les hommes et de 46.2 ans pour les femmes, nettement plus âgé que les autres groupes. A l'opposé, les client-e-s pris en charge principalement pour des problèmes liés au cannabis forment le groupe le plus jeune.

Graphique 3
Âge moyen (en années) des clientes et des clients à l'admission, selon le problème principal (2010)




* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)
** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

2.2.4 Initiative du premier traitement

Pour mieux connaître les motivations qui conduisent à une première prise en charge, seuls les client-e-s traités ou pris en charge pour la première fois pour un problème addictif sont pris en considération dans cette analyse (graphique 4). Ce sont les nouveaux client-e-s ayant principalement un problème avec les opiacés qui disent le plus souvent avoir cherché de l'aide de leur propre initiative et ce sont les client-e-s dont le principal problème est le cannabis qui le disent le moins souvent. Dans ce dernier groupe, ce sont les autres instances qui jouent le rôle le plus important. On trouvera le détail des instances d'envoi pour l'ensemble des client-e-s enregistrés en 2010 dans la section regroupant les tableaux standardisés (tab. 14).

Graphique 4
Principale instance d'envoi des clientes et des clients pour la première prise en charge, selon le problème principal (2010)



Filtre: seuls les client-e-s traités ou pris en charge pour la première fois pour un problème addictif sont pris en considération: N=2361

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase


2.2.5 Âge moyen au moment de la première consommation

Le graphique 5 indique l'âge moyen des client-e-s au moment où ils/elles ont consommé pour la première fois la substance qui leur pose principalement problème. Relevons qu'il s'agit de données rétrospec-

tives, portant souvent sur une longue période, qui ne peuvent pas toujours être communiquées avec exactitude.

Selon les indications des client-e-s concernés, le début de la consommation de cannabis a eu lieu en moyenne à l'âge de 15 ans, soit environ cinq ans plus tôt en moyenne que l'âge du début de la consommation d'opiacés ou de cocaïne, comme on le voit pour les client-e-s ayant l'un ou l'autre de ces problèmes principaux. Selon les données récoltées, l'âge moyen de la première consommation d'alcool chez les personnes ayant cette substance pour principal problème se situe à 16 ans (hommes) ou 18 ans (femmes). Pour les client-e-s du groupe 'alcool', en raison de leur âge généralement plus élevé lors de l'admission, la période rétrospective est plus longue que pour les autres groupes. Il est donc problématique de procéder à des comparaisons directes de l'âge du début de consommation, sans compter que la première consommation d'une substance socialement acceptée telle que l'alcool revêt une autre signification que le premier usage de substances illégales. Dans les différentes catégories de principales substances posant problème, hommes et femmes font état d'âges relativement similaires au moment de la première consommation.

Graphique 5
Âge moyen des clientes et des clients au début de la consommation, selon le problème principal (2010)



* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

2. Clientes et clients des secteurs ambulatoire et résidentiel en 2010


2.2.6 Consommation quotidienne avant l'admission

La consommation quotidienne de substances psychoactives constitue un indicateur important pour apprécier globalement une problématique et plus particulièrement pour déterminer s'il y a dépendance. Le graphique 6 indique la proportion de clientes et de clients qui font état d'une consommation quotidienne de la principale substance posant problème durant la période de référence précédant l'admission.

Dans le graphique 6, les informations relatives à la fréquence de consommation des client-e-s des secteurs résidentiels *act-info-FOS* et *act-info-Residalc* et du secteur ambulatoire *SAMBAD* se réfèrent aux six mois précédant l'admission. Pour les secteurs ambulatoires à long terme *HeGeBe* et traitements substitutifs, la période de référence porte en revanche sur les 30 derniers jours précédant l'admission. La mise en commun de deux périodes de référence distinctes se justifie par le fait que, en particulier pour le secteur résidentiel, les six mois avant le début du traitement donnent une image plus fidèle de la situation de consommation. Trente jours avant l'admission, de nombreux client-e-s se trouvent en clinique de sevrage ou centres de transition et ne consomment pas ou presque par définition.

Plus de la moitié des client-e-s dont le principal problème est l'alcool disent avoir consommé une ou plusieurs fois par jour cette substance avant leur prise en charge. C'est aussi le cas des client-e-s pris en charge pour un problème principal lié aux opiacés. La part des consommateurs quotidiens parmi les client-e-s ayant principalement un problème avec le cannabis ou la cocaïne est plus petite. Parmi ces deux derniers groupes, les différences entre hommes et femmes sont plus marquées, les femmes étant proportionnellement nettement plus nombreuses à signaler un usage quotidien.

Graphique 6
Fréquence de la consommation quotidienne avant l'admission, selon le sexe et le problème principal (2010)



* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase


Période de référence: 6 derniers mois (FOS, Residalc et SAMBAD) ou 30 derniers jours (HeGeBe et Méthadone)

2.2.7 Autres problèmes addictifs au moment de l'admission

La présence, en plus du problème principal, d'autres problèmes liés à des substances ou assimilables à une addiction posent un défi particulier à la prise en charge de personnes dépendantes. Les graphiques 7A à D présentent les substances ou comportements assimilables à une addiction qui – en plus du problème principal - sont aussi considérés comme

problématiques. Pour ces résultats, les quatre plus importantes catégories de substances représentant le problème principal, à savoir l'alcool (7A), les opiacés (7B), la cocaïne (7C) et le cannabis (7D), sont considérées séparément. La part des personnes qui n'indiquent aucun autre problème de dépendance est également prise en compte. L'ordre de présentation reflète la fréquence des mentions. Précisons encore que plusieurs réponses sont possibles.

Graphique 7A (Problème principal: alcool)
Problèmes addictifs secondaires des clientes et des clients avant l'admission (2010)




Chez les client-e-s dont le problème principal est l'alcool, le tabac est la substance problématique secondaire la plus souvent mentionnée (graphique 7A). En comparaison, les autres substances ou comporte-

ments assimilables à une addiction ne jouent qu'un rôle globalement limité. Un peu moins de la moitié des client-e-s de ce groupe ne font état d'aucun autre problème addictif.

2. Clientes et clients des secteurs ambulatoire et résidentiel en 2010

Graphique 7B (Problème principal: opiacés*)


Problèmes addictifs secondaires des clientes et des clients avant l'admission (2010)



Le groupe des client-e-s ayant les opiacés pour principal problème se caractérise par différents autres problèmes addictifs: tabac, cocaïne, cannabis, alcool et médicaments sont fréquemment cités (graphique 7B). La part des client-e-s sans autre problème addictif est relativement petite (moins de 20%). Ces chiffres sont en accord avec les résultats d'analyses approfondies effectuées dans le cadre des statistiques sectorielles, qui suggèrent que la polytoxicomanie est un phénomène fréquent parmi les personnes dépendantes aux opiacés.

Graphique 7C (Problème principal: cocaïne)**

Problèmes addictifs secondaires des clientes et des clients avant l'admission (2010)




Une image comparable se dégage du graphique 7C, qui présente les autres problèmes addictifs du groupe 'cocaïne'. Ici, le tabac, l'alcool, le cannabis, les opiacés et les stimulants sont les autres substances problématiques les plus fréquemment mentionnées.

2. Clientes et clients des secteurs ambulatoire et résidentiel en 2010

Graphique 7D (Problème principal: cannabis)

Problèmes addictifs secondaires des clientes et des clients avant l'admission (2010)




Dans le groupe 'cannabis', ce sont le tabac et l'alcool qui sont le plus souvent cités comme problèmes secondaires (graphique 7D). Dans ce groupe, plus de 40% des personnes ne font état d'aucun autre problème addictif. Ainsi, il est à supposer qu'une part non négligeable des client-e-s dont le principal problème est le cannabis est concernée par le phénomène de la polytoxicomanie.

2.2.8 Consommation par injection avant l'admission

Le graphique 8A présente pour chacune des quatre catégories de problème principal les proportions de client-e-s qui ont consommé des substances illégales par injection au cours de leur vie (prévalence à vie). Le graphique 8B se rapporte, quant à lui, au comportement d'injection au cours des six mois précédant le début de la prise en charge (prévalence sur six mois). Aucune information concernant la ou les substances injectées n'a été recueillie. L'effectif du groupe de référence est chaque fois mentionné (N=100%).

Graphique 8A (Prévalence au cours de la vie)
Injection de substances chez les clientes et les clients avant l'admission, selon le problème principal (2010)




* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Comme on pouvait s'y attendre, ce sont principalement les client-e-s ayant les opiacés pour problème principal qui indiquent avoir déjà consommé des substances illégales par injection (près de sept sur dix). Dans les trois groupes ayant une substance illégale comme problème principal, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à avoir injecté au cours de leur vie (graphique 8A).

Graphique 8B (Prévalence au cours des 6 derniers mois)
Injection de substances chez les clientes et les clients avant l'admission, selon le problème principal (2010)




* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

On observe une image assez similaire pour la prévalence à six mois, bien que les proportions soient dans l'ensemble plus petites: une petite moitié des client-e-s du groupe 'opiacés', un client du groupe 'cocaïne' sur six et une cliente sur quatre de ce même groupe signalent avoir consommé une drogue illégale par injection au cours des six mois qui ont précédé leur prise en charge (graphique 8B). Dans les groupes 'alcool' et 'cannabis', les proportions de client-e-s recourant à l'injection sont très faibles et peuvent être mises en relation avec les données relatives aux autres problèmes mentionnés par ces client-e-s: les drogues injectables sont peu fréquemment citées en tant que substance problématique secondaire (voir le point 2.2.7).

2. Clientes et clients des secteurs ambulatoire et résidentiel en 2010

Graphique 9
Echange de matériel d'injection chez les clientes et les clients ayant injecté au cours des 6 mois avant l'admission (2010)




Le graphique 9 montre, pour tous les client-e-s ayant consommé par injection au cours des six mois précédant l'admission, s'ils ont fait usage de matériel d'injection partagé avec d'autres consommateurs au cours de cette même période. Tous les client-e-s ayant injecté sont pris en compte, indépendamment de leur problème principal. Malgré les risques de contamination par le VIH et le virus de l'hépatite, une proportion relativement élevée de consommateurs ont eu ce comportement à risque: 12.3% des clients et 20.8% des clientes ont utilisé du matériel d'injection partagé.

2.2.9 Données disponibles: sorties enregistrées et problème principal

Le système de monitoring *act-info* a enregistré 8'057 personnes sorties en 2010. Le graphique 10 concerne les client-e-s sortis en 2010 pour lesquels le principal problème au moment de l'admission est connu. Il présente les problèmes principaux que les client-e-s avaient mentionnés au début de leur prise en charge. Les client-e-s pour qui le problème principal fait défaut ne sont pas pris en considération dans les analyses.

Comme pour le graphique 1, seuls les nombres absolus sont indiqués et non les pourcentages, ceci en raison de lacunes encore existantes dans la récolte des données par le système de monitoring. Ainsi, la répartition des principales substances posant problème ne reflète pas forcément la répartition effective des problèmes au sein de la population cible. Une grande partie des client-e-s enregistrés au moment de leur sortie avaient été pris en charge principalement pour des problèmes liés à l'alcool ou aux opiacés.

Graphique 10
Raison principale de la prise en charge des clientes et des clients sortis en 2010



2.3 Tableaux

Tableau 1:

Problème principal, selon le sexe (admissions 2010)

Les résultats se basent uniquement sur les données des institutions participantes et par conséquent ne concernent pas l'ensemble des institutions existantes. Cela vaut pour tous les tableaux suivants.

	Hommes		Femmes		Toutes entrées	
	n	%	n	%	n	%
alcool	3'391	53.6	1'502	59.2	4'893	55.2
cocktail (héroïne et cocaïne)	56	0.9	30	1.2	86	1.0
héroïne	1'225	19.4	398	15.7	1'623	18.3
méthadone	49	0.8	22	0.9	71	0.8
autres opiacés (p. ex. morphine, codéine)	19	0.3	16	0.6	35	0.4
cocaïne	319	5.0	97	3.8	416	4.7
crack, freebase	11	0.2	3	0.1	14	0.2
amphétamines	25	0.4	10	0.4	35	0.4
MDMA et substances similaires (ecstasy)	6	0.1	9	0.4	15	0.2
autres stimulants (p. ex. khat)	2	0.0	1	0.0	3	0.0
barbituriques	1	0.0	1	0.0	2	0.0
benzodiazépines	38	0.6	37	1.5	75	0.8
autres somnifères et tranquillisants	2	0.0	8	0.3	10	0.1
LSD	2	0.0	1	0.0	3	0.0
autres hallucinogènes	3	0.0	0	0.0	3	0.0
cannabis	926	14.6	153	6.0	1'079	12.2
tabac	67	1.1	63	2.5	130	1.5
substances volatiles	1	0.0	2	0.1	3	0.0
autres substances	27	0.4	16	0.6	43	0.5
jeu pathologique	91	1.4	27	1.1	118	1.3
troubles alimentaires	7	0.1	112	4.4	119	1.3
autres comportements de type addictif	57	0.9	30	1.2	87	1.0
Total	6'325	100.0	2'538	100.0	8'863	100.0
données manquantes	9		2		11	

Questions: qmed009 et qmed010

Tableau 2:

Répartition des hommes et des femmes à l'admission, selon le problème principal (2010)

	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
hommes	3'391	69.3	1'349	74.3	330	76.7	926	85.8
femmes	1'502	30.7	466	25.7	100	23.3	153	14.2
Total	4'893	100.0	1'815	100.0	430	100.0	1'079	100.0
données manquantes	0		0		0		0	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmec010

Tableau 3:
Distribution des âges à l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 14 ans	8	0.2	0	0.0	1	0.2	50	4.6
15-19	111	2.3	67	3.7	22	5.1	625	57.9
20-24	197	4.0	249	13.7	68	15.8	160	14.8
25-29	358	7.3	340	18.8	112	26.0	108	10.0
30-34	443	9.1	299	16.5	79	18.4	61	5.7
35-39	516	10.6	317	17.5	63	14.7	31	2.9
40-44	692	14.2	300	16.6	51	11.9	20	1.9
45-49	747	15.3	151	8.3	25	5.8	13	1.2
50-54	713	14.6	67	3.7	6	1.4	7	0.6
55-59	500	10.2	18	1.0	2	0.5	3	0.3
60-64	305	6.3	4	0.2	1	0.2	1	0.1
65-69	178	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-74	75	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75 et plus	36	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	4'879	100.0	1'812	100.0	430	100.0	1'079	100.0
données manquantes	14		3		0		0	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmec020

2.3 Tableaux

Tableau 3 (suite):

Distribution des âges à l'admission, selon le problème principal (2010)

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 14 ans	5	0.1	0	0.0	0	0.0	41	4.4
15-19	87	2.6	28	2.1	13	3.9	546	59.0
20-24	154	4.6	164	12.2	39	11.8	140	15.1
25-29	282	8.3	247	18.3	84	25.5	90	9.7
30-34	333	9.8	231	17.1	70	21.2	53	5.7
35-39	369	10.9	268	19.9	56	17.0	27	2.9
40-44	464	13.7	227	16.9	41	12.4	13	1.4
45-49	494	14.6	111	8.2	20	6.1	9	1.0
50-54	454	13.4	54	4.0	6	1.8	5	0.5
55-59	341	10.1	14	1.0	0	0.0	2	0.2
60-64	209	6.2	3	0.2	1	0.3	0	0.0
65-69	109	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-74	54	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75 et plus	26	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	3'381	100.0	1'347	100.0	330	100.0	926	100.0
données manquantes	10		2		0		0	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 14 ans	3	0.2	0	0.0	1	1.0	9	5.9
15-19	24	1.6	39	8.4	9	9.0	79	51.6
20-24	43	2.9	85	18.3	29	29.0	20	13.1
25-29	76	5.1	93	20.0	28	28.0	18	11.8
30-34	110	7.3	68	14.6	9	9.0	8	5.2
35-39	147	9.8	49	10.5	7	7.0	4	2.6
40-44	228	15.2	73	15.7	10	10.0	7	4.6
45-49	253	16.9	40	8.6	5	5.0	4	2.6
50-54	259	17.3	13	2.8	0	0.0	2	1.3
55-59	159	10.6	4	0.9	2	2.0	1	0.7
60-64	96	6.4	1	0.2	0	0.0	1	0.7
65-69	69	4.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-74	21	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75 et plus	10	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	1'498	100.0	465	100.0	100	100.0	153	100.0
données manquantes	4		1		0		0	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmec020

Tableau 4:
Âge à l'admission, selon le problème principal (2010)

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Total				
moyenne	44.7	34.0	31.6	21.0
écart-type	12.8	9.1	8.5	7.6
1 ^{er} quartile	36.0	26.5	25.0	16.0
valeur médiane	45.0	34.0	30.5	18.0
3 ^e quartile	54.0	41.0	38.0	24.0
N	4'879	1'812	430	1'079
données manquantes	14	3	0	0

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Hommes				
moyenne	44.0	34.6	32.5	20.7
écart-type	13.0	8.9	8.1	7.2
1 ^{er} quartile	34.0	27.0	27.0	16.0
valeur médiane	44.0	35.0	31.0	18.0
3 ^e quartile	53.0	41.0	38.0	23.0
N	3'381	1'347	330	926
données manquantes	10	2	0	0

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Femmes				
moyenne	46.2	32.2	28.5	22.7
écart-type	12.1	9.7	9.0	9.7
1 ^{er} quartile	39.0	24.0	22.0	16.0
valeur médiane	47.0	31.0	26.0	18.0
3 ^e quartile	54.0	40.0	34.0	26.0
N	1'498	465	100	153
données manquantes	4	1	0	0

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmec020

2.3 Tableaux

Tableau 5:
État civil à l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
célibataire	1'825	38.9	1'004	74.4	304	73.3	927	92.5
marié-e	1'407	30.0	146	10.8	57	13.7	43	4.3
séparé-e	289	6.2	51	3.8	20	4.8	8	0.8
divorcé-e	1'022	21.8	137	10.2	32	7.7	23	2.3
veuf/veuve	123	2.6	4	0.3	1	0.2	1	0.1
partenariat enregistré	22	0.5	7	0.5	1	0.2	0	0.0
Total	4'688	100.0	1'349	100.0	415	100.0	1'002	100.0
données manquantes	205		466		15		77	

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
célibataire	1'381	42.7	749	74.9	229	71.8	804	93.5
marié-e	978	30.2	115	11.5	49	15.4	37	4.3
séparé-e	196	6.1	34	3.4	15	4.7	4	0.5
divorcé-e	604	18.7	96	9.6	25	7.8	15	1.7
veuf/veuve	59	1.8	1	0.1	0	0.0	0	0.0
partenariat enregistré	17	0.5	5	0.5	1	0.3	0	0.0
Total	3'235	100.0	1'000	100.0	319	100.0	860	100.0
données manquantes	156		349		11		66	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
célibataire	444	30.6	255	73.1	75	78.1	123	86.6
marié-e	429	29.5	31	8.9	8	8.3	6	4.2
séparé-e	93	6.4	17	4.9	5	5.2	4	2.8
divorcé-e	418	28.8	41	11.7	7	7.3	8	5.6
veuf/veuve	64	4.4	3	0.9	1	1.0	1	0.7
partenariat enregistré	5	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0
Total	1'453	100.0	349	100.0	96	100.0	142	100.0
données manquantes	49		117		4		11	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmec040

Tableau 6:
Nationalité à l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Suisse	3'683	81.6	989	73.9	253	66.4	831	86.7
EU	574	12.7	278	20.8	73	19.2	65	6.8
autre	257	5.7	72	5.4	55	14.4	63	6.6
Total	4'514	100.0	1'339	100.0	381	100.0	959	100.0
données manquantes	379		476		49		120	

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Suisse	2'517	80.4	693	70.3	181	61.6	705	85.8
EU	415	13.3	234	23.7	65	22.1	58	7.1
autre	198	6.3	59	6.0	48	16.3	59	7.2
Total	3'130	100.0	986	100.0	294	100.0	822	100.0
données manquantes	261		363		36		104	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Suisse	1'166	84.2	296	83.9	72	82.8	126	92.0
EU	159	11.5	44	12.5	8	9.2	7	5.1
autre	59	4.3	13	3.7	7	8.0	4	2.9
Total	1'384	100.0	353	100.0	87	100.0	137	100.0
données manquantes	118		113		13		16	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Questions: qmec050 à qmec057

2.3 Tableaux

Tableau 7:
Degré d'urbanisation du lieu de domicile à l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
grands centres urbains	380	8.1	76	4.4	32	7.8	11	1.0
périphérie des grands centres	742	15.8	97	5.6	57	13.8	75	7.1
villes moyennes	749	15.9	480	27.6	95	23.1	278	26.2
petites villes	1'472	31.3	628	36.1	147	35.7	360	33.9
campagne	1'359	28.9	460	26.4	81	19.7	338	31.8
Total	4'702	100.0	1'741	100.0	412	100.0	1'062	100.0
données manquantes	191		74		18		17	

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
grands centres urbains	240	7.4	62	4.8	24	7.6	10	1.1
périphérie des grands centres	507	15.5	59	4.6	43	13.6	67	7.4
villes moyennes	525	16.1	356	27.6	70	22.2	232	25.5
petites villes	1'049	32.2	460	35.7	111	35.1	312	34.3
campagne	940	28.8	351	27.3	68	21.5	289	31.8
Total	3'261	100.0	1'288	100.0	316	100.0	910	100.0
données manquantes	130		61		14		16	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
grands centres urbains	140	9.7	14	3.1	8	8.3	1	0.7
périphérie des grands centres	235	16.3	38	8.4	14	14.6	8	5.3
villes moyennes	224	15.5	124	27.4	25	26.0	46	30.3
petites villes	423	29.4	168	37.1	36	37.5	48	31.6
campagne	419	29.1	109	24.1	13	13.5	49	32.2
Total	1'441	100.0	453	100.0	96	100.0	152	100.0
données manquantes	61		13		4		1	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmec030

Tableau 8:
Situation de domicile à l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
domicile fixe	3'496	91.1	580	72.9	268	78.8	767	91.4
sans domicile fixe	204	5.3	131	16.5	37	10.9	45	5.4
institution	139	3.6	85	10.7	35	10.3	27	3.2
Total	3'839	100.0	796	100.0	340	100.0	839	100.0
données manquantes	1'054		1'019		90		240	

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
domicile fixe	2'402	90.7	426	72.8	209	79.2	648	91.1
sans domicile fixe	141	5.3	95	16.2	24	9.1	38	5.3
institution	104	3.9	64	10.9	31	11.7	25	3.5
Total	2'647	100.0	585	100.0	264	100.0	711	100.0
données manquantes	744		764		66		215	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
domicile fixe	1'094	91.8	154	73.0	59	77.6	119	93.0
sans domicile fixe	63	5.3	36	17.1	13	17.1	7	5.5
institution	35	2.9	21	10.0	4	5.3	2	1.6
Total	1'192	100.0	211	100.0	76	100.0	128	100.0
données manquantes	310		255		24		25	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Période de référence: 6 derniers mois (FOS et Residalc) ou 30 derniers jours (SAMBAD, Méthadone et HeGeBe)

Questions: qmec070 et qmec075

2.3 Tableaux

Tableau 9:
Plus haute formation achevée à l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
aucune form. achevée	192	4.9	116	8.9	31	8.9	163	21.1
scolarité obligatoire	516	13.2	437	33.4	88	25.4	376	48.7
scolarité complémentaire***	2'602	66.5	694	53.1	204	58.8	222	28.8
formations supérieures****	602	15.4	60	4.6	24	6.9	11	1.4
Total	3'912	100.0	1'307	100.0	347	100.0	772	100.0
données manquantes	981		508		83		307	

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
aucune form. achevée	140	5.2	83	8.6	27	9.9	138	20.7
scolarité obligatoire	336	12.4	289	29.9	61	22.4	328	49.2
scolarité complémentaire***	1'803	66.5	550	56.9	161	59.2	193	28.9
formations supérieures****	431	15.9	45	4.7	23	8.5	8	1.2
Total	2'710	100.0	967	100.0	272	100.0	667	100.0
données manquantes	681		382		58		259	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
aucune form. achevée	52	4.3	33	9.7	4	5.3	25	23.8
scolarité obligatoire	180	15.0	148	43.5	27	36.0	48	45.7
scolarité complémentaire***	799	66.5	144	42.4	43	57.3	29	27.6
formations supérieures****	171	14.2	15	4.4	1	1.3	3	2.9
Total	1'202	100.0	340	100.0	75	100.0	105	100.0
données manquantes	300		126		25		48	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

*** Scolarité complémentaire = scolarité complémentaire (1 ou 2 ans), apprentissage ou école professionnelle à plein temps, école préparant à la maturité, école de degré diplôme, école normale

**** Formations supérieures = formation/école professionnelle supérieure, haute école spécialisée, université, haute école

Question: qmec120

Tableau 10:
Source de revenu principale à l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
salaire	2'083	47.2	209	22.1	174	42.3	260	25.7
économies, épargne	89	2.0	10	1.1	6	1.5	10	1.0
rente (AVS, AI, etc.)	753	17.1	159	16.8	39	9.5	32	3.2
aide sociale	674	15.3	396	41.8	106	25.8	103	10.2
assurance- chômage	351	8.0	52	5.5	28	6.8	28	2.8
soutien par partenaire	241	5.5	20	2.1	1	0.2	11	1.1
soutien parents/ proches/amis	128	2.9	42	4.4	22	5.4	549	54.3
deal, combines	1	0.0	24	2.5	15	3.6	4	0.4
autres revenus illégaux	3	0.1	5	0.5	2	0.5	3	0.3
prostitution	1	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0
autre	88	2.0	30	3.2	16	3.9	11	1.1
Total	4'412	100.0	947	100.0	411	100.0	1'011	100.0
données manquantes	481		868		19		68	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Période de référence: 6 derniers mois (FOS et Residalc) ou 30 derniers jours (SAMBAD, Méthadone et HeGeBe)

Questions: qmec080 et qmec090

2.3 Tableaux

Tableau 10 (suite):

Source de revenu principale à l'admission, selon le problème principal (2010)

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
salaire	1'583	52.0	170	24.4	151	47.5	223	25.8
économies, épargne	60	2.0	9	1.3	4	1.3	9	1.0
rente (AVS, AI, etc.)	463	15.2	112	16.1	23	7.2	23	2.7
aide sociale	475	15.6	283	40.7	76	23.9	87	10.1
assurance- chômage	271	8.9	42	6.0	22	6.9	25	2.9
soutien par partenaire	40	1.3	9	1.3	0	0.0	6	0.7
soutien parents/ proches/amis	92	3.0	27	3.9	13	4.1	477	55.1
deal, combines	1	0.0	18	2.6	13	4.1	4	0.5
autres revenus illégaux	3	0.1	4	0.6	2	0.6	2	0.2
prostitution	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
autre	56	1.8	22	3.2	14	4.4	9	1.0
Total	3'045	100.0	696	100.0	318	100.0	865	100.0
données manquantes	346		653		12		61	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
salaire	500	36.6	39	15.5	23	24.7	37	25.3
économies, épargne	29	2.1	1	0.4	2	2.2	1	0.7
rente (AVS, AI, etc.)	290	21.2	47	18.7	16	17.2	9	6.2
aide sociale	199	14.6	113	45.0	30	32.3	16	11.0
assurance- chômage	80	5.9	10	4.0	6	6.5	3	2.1
soutien par partenaire	201	14.7	11	4.4	1	1.1	5	3.4
soutien parents/ proches/amis	36	2.6	15	6.0	9	9.7	72	49.3
deal, combines	0	0.0	6	2.4	2	2.2	0	0.0
autres revenus illégaux	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7
prostitution	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0
autre	32	2.3	8	3.2	2	2.2	2	1.4
Total	1'367	100.0	251	100.0	93	100.0	146	100.0
données manquantes	135		215		7		7	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Période de référence: 6 derniers mois (FOS et Residalc) ou 30 derniers jours (SAMBAD, Méthadone et HeGeBe)

Questions: qmec080 et qmec090

Tableau 11:
Taux d'activité à l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
plein temps (dès 70%)	1'749	41.0	179	19.2	152	37.3	181	18.1
temps partiel	361	8.5	53	5.7	28	6.9	28	2.8
plusieurs activités occasionnelles	47	1.1	20	2.1	5	1.2	10	1.0
en formation	111	2.6	26	2.8	21	5.1	535	53.6
sans activité professionnelle	1'029	24.1	344	36.9	89	21.8	69	6.9
sans travail, en quête d'emploi	670	15.7	195	20.9	76	18.6	106	10.6
sans travail, futur emploi garanti	22	0.5	4	0.4	4	1.0	8	0.8
autre	282	6.6	111	11.9	33	8.1	62	6.2
Total	4'271	100.0	932	100.0	408	100.0	999	100.0
données manquantes	622		883		22		80	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Période de référence: 6 derniers mois (FOS et Residalc) ou 30 derniers jours (SAMBAD, Méthadone et HeGeBe)

Questions: qmec100 et qmec110

2.3 Tableaux

Tableau 11 (suite):

Taux d'activité à l'admission, selon le problème principal (2010)

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
plein temps (dès 70%)	1'416	48.0	152	22.1	134	42.7	162	18.9
temps partiel	136	4.6	35	5.1	21	6.7	17	2.0
plusieurs activités								
occasionnelles	32	1.1	19	2.8	5	1.6	10	1.2
en formation	85	2.9	13	1.9	12	3.8	464	54.3
sans activité professionnelle	575	19.5	235	34.1	63	20.1	52	6.1
sans travail, en quête d'emploi	491	16.6	152	22.1	56	17.8	97	11.3
sans travail, futur emploi garanti	13	0.4	2	0.3	4	1.3	5	0.6
autre	201	6.8	81	11.8	19	6.1	48	5.6
Total	2'949	100.0	689	100.0	314	100.0	855	100.0
données manquantes	442		660		16		71	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
plein temps (dès 70%)	333	25.2	27	11.1	18	19.1	19	13.2
temps partiel	225	17.0	18	7.4	7	7.4	11	7.6
plusieurs activités								
occasionnelles	15	1.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0
en formation	26	2.0	13	5.3	9	9.6	71	49.3
sans activité professionnelle	454	34.3	109	44.9	26	27.7	17	11.8
sans travail, en quête d'emploi	179	13.5	43	17.7	20	21.3	9	6.3
sans travail, futur empl. garanti	9	0.7	2	0.8	0	0.0	3	2.1
autre	81	6.1	30	12.3	14	14.9	14	9.7
Total	1'322	100.0	243	100.0	94	100.0	144	100.0
données manquantes	180		223		6		9	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Période de référence: 6 derniers mois (FOS et Residalc) ou 30 derniers jours (SAMBAD, Méthadone et HeGeBe)

Questions: qmec100 et qmec110

Tableau 12:
Traitements/prises en charge avant l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	2'712	64.3	794	88.4	237	60.9	241	25.6
non	1'508	35.7	104	11.6	152	39.1	701	74.4
Total	4'220	100.0	898	100.0	389	100.0	942	100.0
données manquantes	673		917		41		137	

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	1'782	61.4	590	88.9	180	61.2	201	25.1
non	1'120	38.6	74	11.1	114	38.8	599	74.9
Total	2'902	100.0	664	100.0	294	100.0	800	100.0
données manquantes	489		685		36		126	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	930	70.6	204	87.2	57	60.0	40	28.2
non	388	29.4	30	12.8	38	40.0	102	71.8
Total	1'318	100.0	234	100.0	95	100.0	142	100.0
données manquantes	184		232		5		11	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmeb050

2.3 Tableaux

Tableau 13:
Type de prises en charge avant l'admission, selon le problème principal (2010)

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Total								
traitement avec prescription d'héroïne	27	1.1	46	7.0	7	3.8	0	0.0
substitution (méthadone, Subutex®...)	139	5.8	490	74.2	67	36.2	7	4.3
autre traitem. médic. des dépendances	292	12.2	88	13.3	25	13.5	9	5.6
prise en charge amb.	1'608	67.1	396	60.0	104	56.2	120	74.1
traitement résidentiel	1'314	54.8	339	51.4	113	61.1	43	26.5
sevrage	1'444	60.3	450	68.2	118	63.8	34	21.0
groupe d'entraide	252	10.5	53	8.0	13	7.0	5	3.1
autre(s)	100	4.2	20	3.0	7	3.8	6	3.7
N	2'396		660		185		162	
données manquantes	316		134		52		79	

Plusieurs réponses possibles

¹ Seulement en cas d'expérience de traitement antérieure

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmeb060

Tableau 13 (suite):

Type de prises en charge avant l'admission, selon le problème principal (2010)

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Hommes								
traitement avec prescription d'héroïne	17	1.1	35	7.2	4	2.8	0	0.0
substitution (méthadone, Subutex®...)	96	6.1	358	74.1	49	33.8	5	3.6
autre traitem. médic. des dépendances	201	12.7	60	12.4	18	12.4	6	4.4
prise en charge amb.	1'033	65.5	284	58.8	83	57.2	101	73.7
traitement résidentiel	842	53.4	246	50.9	86	59.3	36	26.3
sevrage	928	58.8	327	67.7	89	61.4	29	21.2
groupe d'entraide	155	9.8	39	8.1	9	6.2	3	2.2
autre(s)	65	4.1	12	2.5	7	4.8	5	3.6
N	1'577		483		145		137	
données manquantes	205		107		35		64	

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Femmes								
traitement avec prescription d'héroïne	10	1.2	11	6.2	3	7.5	0	0.0
substitution (méthadone, Subutex®...)	43	5.3	132	74.6	18	45.0	2	8.0
autre traitem. médic. des dépendances	91	11.1	28	15.8	7	17.5	3	12.0
prise en charge amb.	575	70.2	112	63.3	21	52.5	19	76.0
traitement résidentiel	472	57.6	93	52.5	27	67.5	7	28.0
sevrage	516	63.0	123	69.5	29	72.5	5	20.0
groupe d'entraide	97	11.8	14	7.9	4	10.0	2	8.0
autre(s)	35	4.3	8	4.5	0	0.0	1	4.0
N	819		177		40		25	
données manquantes	111		27		17		15	

Plusieurs réponses possibles

¹ Seulement en cas d'expérience de traitement antérieure

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmeb060

2.3 Tableaux

Tableau 14:
Principale instance d'envoi, selon le problème principal (admissions 2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
initiative personnelle	1'697	37.0	458	47.6	163	39.1	215	20.7
conjoint-e/partenaire	210	4.6	30	3.1	8	1.9	19	1.8
famille	224	4.9	33	3.4	39	9.4	100	9.6
ami-e-s/collègues/ connaissances	85	1.9	24	2.5	21	5.0	9	0.9
institut. ambulatoire (dépendances)	151	3.3	67	7.0	17	4.1	14	1.4
institut. résidentielle (dépendances)	235	5.1	51	5.3	15	3.6	10	1.0
cabinet médical	395	8.6	59	6.1	15	3.6	22	2.1
hôpital/clinique	563	12.3	39	4.1	20	4.8	21	2.0
services sociaux	240	5.2	54	5.6	16	3.8	45	4.3
condamnation/ mesure pénale, adm.	486	10.6	121	12.6	77	18.5	484	46.7
employeur	160	3.5	5	0.5	0	0.0	19	1.8
enseignant-e	2	0.0	2	0.2	0	0.0	25	2.4
autre	137	3.0	19	2.0	26	6.2	54	5.2
Total	4'585	100.0	962	100.0	417	100.0	1'037	100.0
données manquantes	308		853		13		42	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmeb080

Tableau 14 (suite):

Principale instance d'envoi, selon le problème principal (admissions 2010)

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
initiative personnelle	1'102	34.9	346	48.8	124	38.9	171	19.2
conjoint-e/partenaire	160	5.1	20	2.8	6	1.9	17	1.9
famille	138	4.4	20	2.8	28	8.8	88	9.9
ami-e-s/collègues/ connaissances	47	1.5	13	1.8	14	4.4	7	0.8
instit. ambulatoire (dépendances)	84	2.7	47	6.6	9	2.8	11	1.2
instit. résidentielle (dépendances)	163	5.2	38	5.4	12	3.8	7	0.8
cabinet médical	258	8.2	44	6.2	11	3.4	17	1.9
hôpital/clinique	371	11.7	21	3.0	14	4.4	15	1.7
services sociaux	177	5.6	39	5.5	10	3.1	40	4.5
condamnation/ mesure pénale, adm.	433	13.7	101	14.2	71	22.3	439	49.3
employeur	132	4.2	4	0.6	0	0.0	16	1.8
enseignant-e	1	0.0	2	0.3	0	0.0	18	2.0
autre	95	3.0	14	2.0	20	6.3	45	5.1
Total	3'161	100.0	709	100.0	319	100.0	891	100.0
données manquantes	230		640		11		35	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
initiative personnelle	595	41.8	112	44.3	39	39.8	44	30.1
conjoint-e/partenaire	50	3.5	10	4.0	2	2.0	2	1.4
famille	86	6.0	13	5.1	11	11.2	12	8.2
ami-e-s/collègues/ connaissances	38	2.7	11	4.3	7	7.1	2	1.4
instit. ambulatoire (dépendances)	67	4.7	20	7.9	8	8.2	3	2.1
instit. résidentielle (dépendances)	72	5.1	13	5.1	3	3.1	3	2.1
cabinet médical	137	9.6	15	5.9	4	4.1	5	3.4
hôpital/clinique	192	13.5	18	7.1	6	6.1	6	4.1
services sociaux	63	4.4	15	5.9	6	6.1	5	3.4
condamnation/ mesure pénale, adm.	53	3.7	20	7.9	6	6.1	45	30.8
employeur	28	2.0	1	0.4	0	0.0	3	2.1
enseignant-e	1	0.1	0	0.0	0	0.0	7	4.8
autre	42	2.9	5	2.0	6	6.1	9	6.2
Total	1'424	100.0	253	100.0	98	100.0	146	100.0
données manquantes	78		213		2		7	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmeb080

2.3 Tableaux

Tableau 15:
Fréquence de consommation avant l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
jamais	230	6.4	103	13.4	52	14.9	57	6.8
1 jour par semaine ou moins	298	8.3	83	10.8	88	25.1	214	25.6
2 à 3 jours par sem.	564	15.7	82	10.7	62	17.7	148	17.7
4 à 6 jours par sem.	446	12.4	67	8.7	46	13.1	77	9.2
1 fois par jour	431	12.0	160	20.8	24	6.9	97	11.6
plusieurs fois par jour	1'632	45.3	273	35.5	78	22.3	244	29.2
Total	3'601	100.0	768	100.0	350	100.0	837	100.0
données manquantes	1'292		1'047		80		242	

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
jamais	176	7.1	72	12.7	46	16.8	52	7.3
1 jour par semaine ou moins	196	7.9	61	10.8	74	27.1	186	26.3
2 à 3 jours par sem.	375	15.1	61	10.8	48	17.6	128	18.1
4 à 6 jours par sem.	297	12.0	48	8.5	35	12.8	67	9.5
1 fois par jour	302	12.2	126	22.3	14	5.1	77	10.9
plusieurs fois par jour	1'138	45.8	198	35.0	56	20.5	198	28.0
Total	2'484	100.0	566	100.0	273	100.0	708	100.0
données manquantes	907		783		57		218	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
jamais	54	4.8	31	15.3	6	7.8	5	3.9
1 jour par semaine ou moins	102	9.1	22	10.9	14	18.2	28	21.7
2 à 3 jours par sem.	189	16.9	21	10.4	14	18.2	20	15.5
4 à 6 jours par sem.	149	13.3	19	9.4	11	14.3	10	7.8
1 fois par jour	129	11.5	34	16.8	10	13.0	20	15.5
plusieurs fois par jour	494	44.2	75	37.1	22	28.6	46	35.7
Total	1'117	100.0	202	100.0	77	100.0	129	100.0
données manquantes	385		264		23		24	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Période de référence: 6 derniers mois (FOS, Residalc et SAMBAD) ou 30 derniers jours (Méthadone et HeGeBe)

Questions: qmed020 et qmed025

Tableau 16:

Âge lors de la première consommation de la principale substance posant problème (admissions 2010)

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Total				
moyenne	16.8	20.2	20.9	14.8
écart-type	4.5	5.7	6.5	2.5
1 ^{er} quartile	15.0	16.0	17.0	13.5
valeur médiane	16.0	18.0	19.0	15.0
3 ^e quartile	18.0	22.0	23.0	16.0
N	2'628	744	318	808
données manquantes	2'265	1'071	112	271

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Hommes				
moyenne	16.2	20.4	21.3	14.8
écart-type	3.8	5.6	6.6	2.5
1 ^{er} quartile	14.0	17.0	17.0	14.0
valeur médiane	16.0	19.0	20.0	15.0
3 ^e quartile	18.0	23.0	24.0	16.0
N	1'822	557	247	686
données manquantes	1'569	792	83	240

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Femmes				
moyenne	18.0	19.7	19.2	14.9
écart-type	5.7	5.9	5.6	2.8
1 ^{er} quartile	15.0	16.0	16.0	13.0
valeur médiane	17.0	18.0	18.0	14.5
3 ^e quartile	20.0	21.0	21.0	16.0
N	806	187	71	122
données manquantes	696	279	29	31

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmed040

2.3 Tableaux

Tableau 17:

Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (admissions 2010)

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Total				
moyenne	24.5	21.5	23.2	16.0
écart-type	9.7	5.8	7.2	3.3
1 ^{er} quartile	18.0	18.0	18.0	14.0
valeur médiane	20.0	20.0	21.0	15.0
3 ^e quartile	30.0	24.0	27.0	16.0
N	2'505	652	282	639
données manquantes	2'388	1'163	148	440

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Hommes				
moyenne	22.7	21.7	23.9	15.9
écart-type	8.3	5.5	7.4	3.1
1 ^{er} quartile	18.0	18.0	18.0	14.0
valeur médiane	20.0	20.0	22.0	15.0
3 ^e quartile	25.0	25.0	29.0	16.0
N	1'725	488	220	547
données manquantes	1'666	861	110	379

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Femmes				
moyenne	28.4	20.9	20.6	16.4
écart-type	11.2	6.5	5.4	4.3
1 ^{er} quartile	20.0	17.0	17.0	14.0
valeur médiane	25.0	19.0	20.0	16.0
3 ^e quartile	35.0	23.0	23.0	17.0
N	780	164	62	92
données manquantes	722	302	38	61

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmed050

Tableau 18:

Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (admissions 2010)

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Total				
moyenne	33.2	22.5	24.5	16.8
écart-type	12.1	6.5	7.5	4.3
1 ^{er} quartile	24.0	18.0	18.5	15.0
valeur médiane	32.0	21.0	23.0	16.0
3 ^e quartile	40.0	25.0	28.0	17.0
N	2'468	664	300	598
données manquantes	2'425	1'151	130	481

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Hommes				
moyenne	31.9	22.9	25.2	16.7
écart-type	12.0	6.4	7.5	4.2
1 ^{er} quartile	22.0	18.0	19.0	15.0
valeur médiane	30.0	21.0	24.0	16.0
3 ^e quartile	40.0	26.0	30.0	17.0
N	1'647	494	233	503
données manquantes	1'744	855	97	423

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne**	Cannabis
Femmes				
moyenne	35.8	21.5	21.8	17.3
écart-type	11.9	6.7	6.6	5.1
1 ^{er} quartile	27.0	17.0	18.0	14.0
valeur médiane	35.0	19.5	20.0	16.0
3 ^e quartile	44.0	24.0	25.0	18.0
N	821	170	67	95
données manquantes	681	296	33	58

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmed060

2.3 Tableaux

Tableau 19:
Autres problèmes addictifs à l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
aucun	1'693	49.0	121	16.7	55	17.4	281	45.0
alcool	-		252	34.8	144	45.4	154	24.6
opiacés*	155	4.5	-		95	30.0	28	4.5
cocaïne**	248	7.2	354	48.9	-		65	10.4
stimulants	71	2.1	117	16.2	75	23.7	35	5.6
médicaments***	213	6.2	229	31.6	58	18.3	11	1.8
hallucinogènes	36	1.0	79	10.9	35	11.0	24	3.8
cannabis	375	10.8	302	41.7	127	40.1	-	
tabac	1'366	39.5	385	53.2	152	47.9	229	36.6
substances volatiles	4	0.1	10	1.4	7	2.2	2	0.3
autre(s) substance(s)	21	0.6	6	0.8	1	0.3	4	0.6
troubles assimilables à une addiction	112	3.2	40	5.5	24	7.6	19	3.0
N	3'458		724		317		625	
données manquantes	1'435		1'091		113		454	

Plusieurs réponses possibles

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

*** Médicaments = barbituriques, benzodiazépines, autres somnifères et tranquillisants

Question: qmed070

Tableau 19 (suite):

Autres problèmes addictifs à l'admission, selon le problème principal (2010)

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
aucun	1'182	49.7	96	18.1	46	18.9	247	45.9
alcool	-		184	34.7	111	45.5	133	24.7
opiacés*	107	4.5	-		67	27.5	22	4.1
cocaïne**	182	7.7	248	46.7	-		55	10.2
stimulants	55	2.3	85	16.0	55	22.5	27	5.0
médicaments***	119	5.0	154	29.0	41	16.8	7	1.3
hallucinogènes	27	1.1	60	11.3	28	11.5	19	3.5
cannabis	284	11.9	227	42.7	92	37.7	-	
tabac	932	39.2	275	51.8	115	47.1	194	36.1
substances volatiles	2	0.1	8	1.5	6	2.5	2	0.4
autre(s) substance(s)	13	0.5	4	0.8	1	0.4	3	0.6
troubles assimilables à une addiction	43	1.8	15	2.8	19	7.8	15	2.8
N	2'379		531		244		538	
données manquantes	1'012		818		86		388	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
aucun	511	47.4	25	13.0	9	12.3	34	39.1
alcool	-		68	35.2	33	45.2	21	24.1
opiacés*	48	4.4	-		28	38.4	6	6.9
cocaïne**	66	6.1	106	54.9	-		10	11.5
stimulants	16	1.5	32	16.6	20	27.4	8	9.2
médicaments***	94	8.7	75	38.9	17	23.3	4	4.6
hallucinogènes	9	0.8	19	9.8	7	9.6	5	5.7
cannabis	91	8.4	75	38.9	35	47.9	-	
tabac	434	40.2	110	57.0	37	50.7	35	40.2
substances volatiles	2	0.2	2	1.0	1	1.4	0	0.0
autre(s) substance(s)	8	0.7	2	1.0	0	0.0	1	1.1
troubles assimilables à une addiction	69	6.4	25	13.0	5	6.8	4	4.6
N	1'079		193		73		87	
données manquantes	423		273		27		66	

Plusieurs réponses possibles

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

*** Médicaments = barbituriques, benzodiazépines, autres somnifères et tranquillisants

Question: qmed070

2.3 Tableaux

Tableau 20:

Injection de drogues illégales au cours de la vie, selon le problème principal (admissions 2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	235	6.9	540	68.1	90	28.5	27	3.1
non	3'166	93.1	253	31.9	226	71.5	832	96.9
Total	3'401	100.0	793	100.0	316	100.0	859	100.0
données manquantes	1'492		1'022		114		220	

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	163	7.0	387	66.3	64	26.4	17	2.3
non	2'169	93.0	197	33.7	178	73.6	713	97.7
Total	2'332	100.0	584	100.0	242	100.0	730	100.0
données manquantes	1'059		765		88		196	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	72	6.7	153	73.2	26	35.1	10	7.8
non	997	93.3	56	26.8	48	64.9	119	92.2
Total	1'069	100.0	209	100.0	74	100.0	129	100.0
données manquantes	433		257		26		24	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmed090

Tableau 21:
Âge lors de la première injection, selon le problème principal (admissions 2010)

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Total								
jusqu'à 14 ans	5	3.6	19	4.7	2	2.8	0	0.0
15-19	56	40.0	166	41.3	29	40.3	8	40.0
20-24	38	27.1	125	31.1	17	23.6	5	25.0
25-29	25	17.9	59	14.7	12	16.7	5	25.0
30-34	8	5.7	20	5.0	8	11.1	1	5.0
35-39	4	2.9	10	2.5	2	2.8	1	5.0
40 et plus	4	2.9	3	0.7	2	2.8	0	0.0
Total	140	100.0	402	100.0	72	100.0	20	100.0
données manquantes	95		138		18		7	

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Hommes								
jusqu'à 14 ans	2	2.1	12	4.1	0	0.0	0	0.0
15-19	34	35.4	113	38.8	18	34.6	3	25.0
20-24	32	33.3	95	32.6	17	32.7	4	33.3
25-29	20	20.8	46	15.8	8	15.4	3	25.0
30-34	3	3.1	15	5.2	6	11.5	1	8.3
35-39	3	3.1	8	2.7	1	1.9	1	8.3
ab 40 Jahre	2	2.1	2	0.7	2	3.8	0	0.0
Total	96	100.0	291	100.0	52	100.0	12	100.0
données manquantes	67		96		12		5	

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Femmes								
jusqu'à 14 ans	3	6.8	7	6.3	2	10.0	0	0.0
15-19	22	50.0	53	47.7	11	55.0	5	62.5
20-24	6	13.6	30	27.0	0	0.0	1	12.5
25-29	5	11.4	13	11.7	4	20.0	2	25.0
30-34	5	11.4	5	4.5	2	10.0	0	0.0
35-39	1	2.3	2	1.8	1	5.0	0	0.0
40 et plus	2	4.5	1	0.9	0	0.0	0	0.0
Total	44	100.0	111	100.0	20	100.0	8	100.0
données manquantes	28		42		6		2	

¹ Seulement en cas d'injection au cours de la vie

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmed096

2.3 Tableaux

Tableau 22:
Injection au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	45	1.3	352	47.6	59	18.8	7	0.8
non	3'365	98.7	388	52.4	254	81.2	850	99.2
Total	3'410	100.0	740	100.0	313	100.0	857	100.0
données manquantes	1'483		1'075		117		222	

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	28	1.2	258	47.0	42	17.4	5	0.7
non	2'305	98.8	291	53.0	200	82.6	723	99.3
Total	2'333	100.0	549	100.0	242	100.0	728	100.0
données manquantes	1'058		800		88		198	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	17	1.6	94	49.2	17	23.9	2	1.6
non	1'060	98.4	97	50.8	54	76.1	127	98.4
Total	1'077	100.0	191	100.0	71	100.0	129	100.0
données manquantes	425		275		29		24	

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmed091

Tableau 23:

Echange de matériel d'injection au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2010)

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
Total	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	2	6.1	35	14.3	10	22.2	0	0.0
non	31	93.9	209	85.7	35	77.8	3	100.0
Total	33	100.0	244	100.0	45	100.0	3	100.0
données manquantes	12		108		14		4	

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
Hommes	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	2	9.5	22	12.3	4	12.5	0	0.0
non	19	90.5	157	87.7	28	87.5	2	100.0
Total	21	100.0	179	100.0	32	100.0	2	100.0
données manquantes	7		79		10		3	

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
Femmes	n	%	n	%	n	%	n	%
oui	0	0.0	13	20.0	6	46.2	0	0.0
non	12	100.0	52	80.0	7	53.8	1	100.0
Total	12	100.0	65	100.0	13	100.0	1	100.0
données manquantes	5		29		4		1	

¹ Seulement en cas d'injection durant les 6 mois précédents

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmed092

2.3 Tableaux

Tableau 24:
Problème principal selon le sexe (sorties 2010)

	Hommes		Femmes		Toutes sorties	
	n	%	n	%	n	%
alcool	3'207	57.8	1'400	60.7	4'658	58.4
cocktail (héroïne et cocaïne)	48	0.9	20	0.9	68	0.9
héroïne	894	16.1	325	14.1	1'241	15.6
méthadone	49	0.9	18	0.8	67	0.8
autres opiacés (p. ex. morphine)	14	0.3	11	0.5	25	0.3
cocaïne	293	5.3	87	3.8	388	4.9
crack, freebase	13	0.2	1	0.0	14	0.2
amphétamines	21	0.4	10	0.4	31	0.4
MDMA et substances similaires (ecstasy)	4	0.1	6	0.3	10	0.1
autres stimulants (p.ex. khat)	0	0.0	2	0.1	3	0.0
barbituriques	2	0.0	0	0.0	2	0.0
benzodiazépines	27	0.5	34	1.5	63	0.8
autres somnifères et tranquillisants	3	0.1	5	0.2	8	0.1
LSD	2	0.0	1	0.0	3	0.0
autres hallucinogènes	2	0.0	0	0.0	2	0.0
cannabis	739	13.3	149	6.5	905	11.4
tabac	84	1.5	67	2.9	151	1.9
substances volatiles	3	0.1	1	0.0	4	0.1
autre substance	17	0.3	14	0.6	45	0.6
jeu pathologique	84	1.5	20	0.9	104	1.3
troubles alimentaires	4	0.1	118	5.1	122	1.5
autres comportements de type addictif	38	0.7	18	0.8	56	0.7
Total	5'548	100.0	2'307	100.0	7'970	100.0
données manquantes	63		22		87	

Le problème principal est déterminé au moment de l'admission
Questions: qmed009 et qmed010 du questionnaire d'entrée

Tableau 25:
Répartition des hommes et des femmes à la sortie, selon le problème principal (2010)

	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
hommes	3'207	69.6	1'005	72.9	306	77.7	739	83.2
femmes	1'400	30.4	374	27.1	88	22.3	149	16.8
Total	4'607	100.0	1'379	100.0	394	100.0	888	100.0
données manquantes	51		22		8		17	

Le problème principal est déterminé au moment de l'admission
* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)
** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase
Question: qmac001

Tableau 26:
Distribution des âges à la sortie, selon le problème principal (2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 14 ans	4	0.1	0	0.0	0	0.0	21	2.4
15-19	82	1.8	21	1.5	15	3.8	523	59.4
20-24	177	3.9	136	9.9	56	14.3	127	14.4
25-29	293	6.4	220	16.0	97	24.8	100	11.4
30-34	393	8.6	242	17.7	77	19.7	56	6.4
35-39	462	10.1	296	21.6	60	15.3	26	3.0
40-44	620	13.6	236	17.2	59	15.1	15	1.7
45-49	714	15.6	140	10.2	19	4.9	7	0.8
50-54	699	15.3	56	4.1	7	1.8	5	0.6
55-59	494	10.8	22	1.6	1	0.3	1	0.1
60-64	347	7.6	2	0.1	0	0.0	0	0.0
65-69	175	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-74	72	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75 et plus	34	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	4'566	100.0	1'371	100.0	391	100.0	881	100.0
données manquantes	92		30		11		24	

Le problème principal est déterminé au moment de l'admission

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmac005

2.3 Tableaux

Tableau 26 (suite):

Distribution des âges à la sortie, selon le problème principal (2010)

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 14 ans	3	0.1	0	0.0	0	0.0	18	2.4
15-19	64	2.0	6	0.6	13	4.3	446	60.7
20-24	132	4.2	83	8.3	35	11.5	107	14.6
25-29	243	7.6	133	13.3	79	25.9	83	11.3
30-34	275	8.7	189	18.9	59	19.3	43	5.9
35-39	334	10.5	249	24.9	54	17.7	21	2.9
40-44	415	13.1	175	17.5	45	14.8	10	1.4
45-49	496	15.6	98	9.8	12	3.9	4	0.5
50-54	457	14.4	47	4.7	7	2.3	2	0.3
55-59	336	10.6	19	1.9	1	0.3	1	0.1
60-64	232	7.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0
65-69	113	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-74	51	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75 et plus	27	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	3'178	100.0	1'000	100.0	305	100.0	735	100.0
données manquantes	29		5		1		4	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
jusqu'à 14 ans	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	2.1
15-19	18	1.3	15	4.0	2	2.3	77	52.7
20-24	45	3.2	53	14.3	21	24.4	20	13.7
25-29	50	3.6	87	23.5	18	20.9	17	11.6
30-34	118	8.5	53	14.3	18	20.9	13	8.9
35-39	128	9.2	47	12.7	6	7.0	5	3.4
40-44	205	14.8	61	16.4	14	16.3	5	3.4
45-49	218	15.7	42	11.3	7	8.1	3	2.1
50-54	242	17.4	9	2.4	0	0.0	3	2.1
55-59	158	11.4	3	0.8	0	0.0	0	0.0
60-64	115	8.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
65-69	62	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
70-74	21	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75 et plus	7	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	1'388	100.0	371	100.0	86	100.0	146	100.0
données manquantes	12		3		2		3	

Le problème principal est déterminé au moment de l'admission

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmac005

Tableau 27:
Âge à la sortie, selon le problème principal (2010)

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne **	Cannabis
Total				
moyenne	45.6	35.5	32.2	21.2
écart-type	12.7	8.8	8.0	7.0
1 ^{er} quartile	37.0	29.0	26.0	17.0
valeur médiane	46.0	36.0	31.0	18.0
3 ^e quartile	54.0	42.0	38.0	24.0
N	4'566	1'371	391	881
données manquantes	92	30	11	24

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne **	Cannabis
Hommes				
moyenne	45.0	36.3	32.4	20.8
écart-type	12.9	8.4	8.0	6.6
1 ^{er} quartile	36.0	30.0	27.0	17.0
valeur médiane	46.0	36.0	32.0	18.0
3 ^e quartile	54.0	42.0	38.0	23.0
N	3'178	1'000	305	735
données manquantes	29	5	1	4

	Alcool	Opiacés*	Cocaïne **	Cannabis
Femmes				
moyenne	46.8	33.4	31.4	22.9
écart-type	12.1	9.3	8.2	8.7
1 ^{er} quartile	39.0	26.0	24.0	17.0
valeur médiane	47.0	31.0	30.5	19.0
3 ^e quartile	55.0	41.0	38.0	27.0
N	1'388	371	86	146
données manquantes	12	3	2	3

Le problème principal est déterminé au moment de l'admission

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmac005

2.3 Tableaux

Tableau 28:
Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (sorties 2010)

Total	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
fin régulière sans transfert	2'104	45.4	184	20.1	122	30.4	561	62.8
fin régulière avec transfert	671	14.5	236	25.8	47	11.7	41	4.6
changement domicile	102	2.2	42	4.6	23	5.7	16	1.8
hospitalisation	44	0.9	7	0.8	9	2.2	3	0.3
détention	4	0.1	12	1.3	10	2.5	4	0.4
perte de contact	919	19.8	183	20.0	87	21.7	155	17.4
rupture explicite	631	13.6	210	23.0	91	22.7	89	10.0
décès	64	1.4	22	2.4	6	1.5	3	0.3
autre raison	98	2.1	18	2.0	6	1.5	21	2.4
Total	4'637	100.0	914	100.0	401	100.0	893	100.0
données manquantes	21		487		1		12	

Le problème principal est déterminé au moment de l'admission

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmab040

Tableau 28 (suite):

Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (sorties 2010)

Hommes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
fin régulière sans transfert	1'458	45.6	126	19.2	94	30.8	465	63.5
fin régulière avec transfert	433	13.6	167	25.5	26	8.5	30	4.1
changement domicile	71	2.2	24	3.7	19	6.2	13	1.8
hospitalisation	25	0.8	5	0.8	7	2.3	3	0.4
détention	3	0.1	10	1.5	9	3.0	4	0.5
perte de contact	660	20.7	140	21.4	68	22.3	123	16.8
rupture explicite	431	13.5	153	23.4	72	23.6	71	9.7
décès	48	1.5	17	2.6	6	2.0	3	0.4
autre raison	65	2.0	13	2.0	4	1.3	20	2.7
Total	3'194	100.0	655	100.0	305	100.0	732	100.0
données manquantes	13		350		1		7	

Femmes	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
fin régulière sans transfert	626	45.0	54	22.8	25	28.4	89	61.8
fin régulière avec transfert	235	16.9	62	26.2	20	22.7	7	4.9
changement domicile	31	2.2	13	5.5	4	4.5	3	2.1
hospitalisation	18	1.3	2	0.8	2	2.3	0	0.0
détention	1	0.1	2	0.8	1	1.1	0	0.0
perte de contact	245	17.6	40	16.9	15	17.0	26	18.1
rupture explicite	188	13.5	55	23.2	19	21.6	18	12.5
décès	15	1.1	4	1.7	0	0.0	0	0.0
autre raison	33	2.4	5	2.1	2	2.3	1	0.7
Total	1'392	100.0	237	100.0	88	100.0	144	100.0
données manquantes	8		137		0		5	

Le problème principal est déterminé au moment de l'admission

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmab040

2.3 Tableaux

Tableau 29:

Raison principale de la fin de la prise en charge: destination des transferts, selon le problème principal (sorties 2010)

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Total								
traitement résidentiel	58	10.1	27	13.6	10	25.6	4	14.3
prise en charge ambulatoire	422	73.3	113	56.8	22	56.4	15	53.6
appartement protégé	20	3.5	20	10.1	4	10.3	5	17.9
autre institution spécialisée	76	13.2	39	19.6	3	7.7	4	14.3
Total	576	100.0	199	100.0	39	100.0	28	100.0
données manquantes	95		37		8		13	

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Hommes								
traitement résidentiel	36	9.8	18	13.3	4	19.0	3	15.0
prise en charge ambulatoire	271	73.8	80	59.3	10	47.6	10	50.0
appartement protégé	14	3.8	12	8.9	4	19.0	5	25.0
autre institution spécialisée	46	12.5	25	18.5	3	14.3	2	10.0
Total	367	100.0	135	100.0	21	100.0	20	100.0
données manquantes	66		32		5		10	

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Femmes								
traitement résidentiel	22	10.7	9	15.8	5	29.4	0	0.0
prise en charge ambulatoire	150	72.8	31	54.4	12	70.6	4	100.0
appartement protégé	6	2.9	8	14.0	0	0.0	0	0.0
autre institution spécialisée	28	13.6	9	15.8	0	0.0	0	0.0
Total	206	100.0	57	100.0	17	100.0	4	100.0
données manquantes	29		5		3		3	

Le problème principal est déterminé au moment de l'admission

¹ Seulement en cas de fin régulière avec transfert

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmab041

Tableau 30:

Raison principale de la fin de la prise en charge: cause du décès, selon le problème principal (sorties 2010)

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Total								
suicide	7	17.5	1	7.1	0	0.0	1	100.0
accident	6	15.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
maladie	23	57.5	10	71.4	1	20.0	0	0.0
surdose ou								
intoxication aiguë	4	10.0	3	21.4	2	40.0	0	0.0
autre cause de décès	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
Total	40	100.0	14	100.0	5	100.0	1	100.0
données manquantes	24		8		1		2	

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Hommes								
suicide	3	9.4	1	10.0	0	0.0	1	100.0
accident	5	15.6	0	0.0	1	20.0	0	0.0
maladie	21	65.6	6	60.0	1	20.0	0	0.0
surdose ou								
intoxication aiguë	3	9.4	3	30.0	2	40.0	0	0.0
autre cause de décès	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0
Total	32	100.0	10	100.0	5	100.0	1	100.0
données manquantes	16		7		1		2	

Filtre ¹	Alcool		Opiacés*		Cocaïne**		Cannabis	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Femmes								
suicide	3	42.9	0	0.0	0		0	
accident	1	14.3	0	0.0	0		0	
maladie	2	28.6	3	100.0	0		0	
surdose ou								
intoxication aiguë	1	14.3	0	0.0	0		0	
autre cause de décès	0	0.0	0	0.0	0		0	
Total	7	100.0	3	100.0	0		0	
données manquantes	8		1		0		0	

Le problème principal est déterminé au moment de l'admission

¹ Seulement en cas de décès

* Opiacés = héroïne, méthadone, autres opiacés et cocktail (héroïne et cocaïne)

** Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

Question: qmab044

Bibliographie

Astudillo M, Notari L, Maffli E, (2011). Prise en charge ambulatoire des problèmes de dépendance - Résultats de l'enquête auprès des client-e-s 2010 – Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Info Suisse.

Babor TF, de la Fuente JR, Saunders J, Grant M (1992). AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Tests: guidelines for use in primary health care. Geneva: World Health Organization.

DG-Sucht (2001). Documentation Standards III for the evaluation of addictive treatment. Sucht 47 (Sonderheft 2).

Donmall M (2006). Guidance for the measurement of drug treatment demand. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime and the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

EMCDDA (2000). Treatment Demand Indicator Standard Protocol 2.0. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerstrom KO (1991). The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. Br J Addict 86:1119-27.

Maffli E, Schaaf S, Delgrande Jordan M, Güttinger F (2008). Treatment of substance-related problems in Switzerland: implementing a new harmonised monitoring system. Int J Public Health 53: 31-39.

McLellan AT, Kushner H, Metzger D, et al. (1992). The Fifth Edition of the Addiction Severity Index. J Subst Abuse Treat 9: 199-213.

Indication concernant les questionnaires

Les questionnaires contenant les variables de base peuvent être consultés à cette adresse:

www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00632/03290/03293/index.html?lang=fr

Impressum

© Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Editeur: Office fédéral de la santé publique
Publication: décembre 2011

Informations complémentaires :
OFSP, Santé publique, Section programmes nationaux de prévention
3003 Berne, téléphone +41 (0)31 323 87 70, fax +41 (0)31 323 87 89
Courriel : verena.maag@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch, www.act-info.ch

Cette publication est également disponible en allemand

Auteurs : Etienne Maffli, Marina Delgrande Jordan, Susanne Schaaf, Michael Schaub,
Urs Künzi
Layout : Silversign, visuelle Kommunikation, Berne
Illustration : Silversign, visuelle Kommunikation, Berne
Photos: Fotolia

BAG OeG 12.11 100 d 50 f 20EXT1134

Imprimé sur du papier blanchi sans chlore